REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

UNIVERSITE EL-HADJ LAKHDAR
BATNA

FACULTE DES SCIENCES
DEPARTEMENT DE CHIMIE

MEMOIRE

Présenté pour l'obtention du diplôme de

MAGISTER

Option : Chimie Organique

Par Mlle : **GOLEA Lynda**

THEME

SYNTHESE D'UNE SERIE D'ALCOOLS & LACTONES QUINOLEIQUES

Devant la commission d'examen :

✚ A. DIBI	<i>Prof, Université de Batna</i>	<i>Président</i>
✚ M. LAABASSI	<i>Prof, Université de Batna</i>	<i>Rapporteur</i>
✚ Y. BOUZAHER	<i>Prof, Université de Batna</i>	<i>Examineur</i>
✚ M. BENKHALED	<i>Prof, Université de Batna</i>	<i>Examineur</i>
✚ N. BEN ALI CHERIF	<i>Prof, Centre Universitaire Khenchela</i>	<i>Examineur</i>

Année 2006

Dédicaces

Au terme de ce modeste travail je tiens à dédié à :

- ◆ *A mon père, pour son amour, son encouragement, son soutien moral et matériel.*
- ◆ *A ma mère, symbole d'affection, d'amour et de sacrifices avec toute ma reconnaissance.*
- ◆ *A mes frères et sœurs et mon beau frère.*

Sans oublier Romeissa, Haithem & Nassim

A tous qui me sont chers au monde

Avant - Propos

Ce travail a été effectué au laboratoire de synthèse organique de l'Université de Batna, sous la direction de **M. LAABASSI MOHAMMED**. Je tiens tout particulièrement à lui exprimer ma profonde reconnaissance pour m'avoir proposé le sujet de ce mémoire, et accueilli dans son laboratoire. Je tiens aussi à lui témoigner toute ma gratitude pour tous les conseils, orientations et encouragements, qu'il n'a cessé de me prodiguer, ainsi que l'intérêt qu'il a constamment manifesté pour ce travail.

Mes remerciements s'adressent également à **M. DIBI AMMAR**, Professeur à l'Université de Batna, qui m'a fait l'honneur de présider et de juger ce travail.

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements à Messieurs les professeurs **BENKHALED MOHAMMED, BOUZAHER YASSINE** de l'université de Batna et **BEN ALI CHERIF. NOUREDDINE** du centre Universitaire de KHENCHELA pour avoir bien voulu accepter de juger ce travail.

Je tiens aussi à exprimer mes sincères remerciements à Messieurs le Docteur **PAUL MOSSET** et le Docteur **JEAN CLAUDE GUILLEMIN**, pour les discussions fructueuses et la réalisation des analyses physico-chimiques (RMN ^1H 400 MHZ) effectuées à l'Ecole Nationale Supérieure de Chimie de Rennes. Ainsi qu'à **M. GUENOT PIERRE** Directeur du Centre de Mesures Physiques de l'Ouest pour l'enregistrement des spectres de masse.

Mes remerciements s'adressent également à tous mes collègues et mes amis, particulièrement : **Habiba, Fatiha, Abla, Hanane, Fatima, Hassina, Nabila, Hakim, Haba, Abdelmalek & Rachid.**

Enfin que tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce travail soient ici remerciés.

Abréviations utilisées

DMF	:	N, N-diméthylformamide
POCl₃	:	Oxychlorure de phosphore
DMSO	:	Diméthylsulfoxyde
Ac₂O	:	Anhydride acétique
THF	:	Tétrahydrofurane
Et	:	éthyle
Eq	:	équivalent
Me	:	méthyle
Rdt	:	Rendement
RMN	:	Résonance Magnétique Nucléaire
Tfus.	:	Température de fusion
CCM	:	Chromatographie sur couche mince
IR	:	Infra-rouge
ppm	:	parties par million
Rf	:	Facteur de rétention
PPA	:	Acide Polyphosphorique
APTH	:	Acide <i>para</i> -toluènesulfonique
Pdécom	:	Point décomposition
NMDA	:	N-diméthyl-D-aspartate

Table des matières

Introduction générale.....	01
----------------------------	----

Chapitre 1: Intérêt biologique des dérivés de la quinoléine

I-1: Introduction.....	03
I-2: Intérêt biologique des dérivés de la quinoléine.....	04
I-3: Les méthodes de synthèses.....	08
I-4: Conclusion.....	15
Bibliographie.....	16

Chapitre 2 : Préparation des alcools quinoléiques

II-1: Introduction	18
II-2 : Intérêt biologique des dérivés quinoléiques substitués en position 2 et 3.....	19
II-3: Résultats et discussions.....	27
1)-préparation des dérivés de 2-chloro-3-formylquinoléine.....	27
2)-Protection des fonctions aldéhydes.....	28
3)-Substitution du chlore en position 2 des quinoléines.....	31
4)-Déprotection des fonctions aldéhydes.....	34
5)- Alkylation de la fonction aldéhyde.....	37
II-4: Conclusion.....	41
II-5: Partie expérimentale.....	42
a) Préparation des acétals	42
b) La substitution nucléophile	47
c) Déprotection de l'acétal (obtention de l'aldéhyde).....	52
d) L'alkylation	57
Bibliographie.....	63

Chapitre 3 : Préparation des lactones quinoléiques

III-1: Introduction	64
III-2 : L'activité biologique des dérivés des quinolones.....	65
III-3 : Rappel bibliographique sur les méthodes de synthèse des quinolones.....	69
III-4 : Résultats et discussions.....	73
1) -Synthèse des quinolones.....	76
2)-Synthèse des oléfines.....	79
3) -Synthèse des produits alkylés.....	83
4) -Synthèse des lactones quinoléiques.....	87
III-5: Conclusion.....	93
III-6: Partie expérimentale.....	94
a) -Préparation des quinolones.....	94
b) -Préparation des oléfines.....	98
c) -Préparation des produits alkylés.....	103
d) -Préparation des lactones quinoléiques.....	109
Bibliographie.....	115
Conclusion générale.....	117
Annexes.....	

Introduction Générale

Introduction Générale

Depuis les débuts de la recherche pharmaceutique, les produits d'origine naturelle ont été pour les chimistes une de leurs sources d'inspiration pour la création de nouvelles molécules bioactives. Il en a donc été ainsi avec les alcaloïdes du quinquina dont le principal représentant est la quinine.

Ce produit est à l'origine de toute une série de composés antimalariques ¹ dont les principaux représentants sont la chloroquine, et la primaquine ².

La quinine est aussi à l'origine de la découverte des propriétés antiarythmiques de la quinidine³. C'est en effet, en 1914, que WENCKBACH constate qu'en soignant des patients atteints de malaria et souffrants de troubles du rythme, les symptômes s'atténuent lors de l'utilisation de la quinine. Les aldéhydes quinoléiques sont également doués de propriétés antiseptiques et comme inhibiteurs de radicaux libres. Donc potentiellement anticancéreux.

Notre laboratoire a développé un axe de recherche consacré principalement à la synthèse de produits nouveaux à base de noyaux quinoléique et au comportement de certains de ces composants vis-à-vis de nouvelles réactions, dans le but d'obtenir de nouveaux produits biologiquement actifs.

Notre travail s'articule sur trois parties :

-La première partie, est consacrée aux travaux antérieurs sur les dérivés quinoléiques à savoir : leur activité biologique et leur utilisation dans le domaine médical et les différentes méthodes de synthèse des chloro-2-formyl-3-quinoléines à partir des acétanilides correspondants.

-La deuxième partie concerne la synthèse des alcools quinoléiques par l'utilisation de réactions simples et faciles de mise en œuvre, telle que la protection et la substitution nucléophile et l'hydrolyse puis l'alkylation.

-Dans la troisième partie, on a synthétisé des lactones quinoléiques au moyen d'une séquence courte et efficace à partir des 2-chloro-3-formyl-quinoléines. On a masqué la position 2 sous forme de quinolones, puis l'aldéhyde en position 3 est condensé avec l'acide de Meldrum pour conduire, avec d'excellents rendements aux oléfines correspondants

suivi d'addition conjuguée de $C_6H_5CH_2MgCl$ et enfin l'hydrolyse du motif acide de Meldrum pour obtenir les lactones attendus, comme le montre le Schéma suivant :

Schéma réactionnel général

- $R_1 = R_2 = R_3 = R_4 = H$
- $R_1 = CH_3, R_2 = R_3 = H$
- $R_1 = R_2 = H, R_3 = CH_3$
- $R_1 = R_3 = H, R_2 = OCH_3$
- $R_2 = R_3 = H, R_1 = OCH_3$

Chapitre 1
Intérêt biologique des dérivés
de la Quinoléine

I-1-Introduction

Les recherches pharmaceutiques sur les produits naturels, représentent une stratégie majeure pour la découverte et le développement de nouvelles substances à intérêt biologique. Les dérivés de la quinoléine sont largement rencontrés dans la nature. Ils sont très utilisés comme des substances anti malariques ¹, antibactériennes ³, anti-tumorales ⁵ et antifongiques. Ils sont utilisés également en teinture tel que le jaune de quinoléine.

La quinine, principe actif extrait de l'écorce du "*quinquina*", représente le plus ancien et le plus connu des dérivés de la quinoléine. Il a été utilisé principalement dans le traitement de la malaria.

Dans ce qui suit, nous allons donner un bref aperçu sur l'utilisation et l'intérêt biologique de quelques substances à noyau quinoléique avec un rappel bibliographique sur les méthodes de synthèse les plus utilisées du chromophore quinoléique. Les résultats obtenus et les différents commentaires auxquels nous sommes parvenus seront également présentés.

La méthodologie envisagée consiste, à partir de molécules simples (amines aromatiques) et à l'aide du réactif de *Vielsmeier*, d'accéder aux dérivés du 2-chloro-3-formylquinoléine lesquels nous permettront d'accéder à des dérivés quinoléiques activés de structures diversifiées par la suite.

I-2- Intérêt biologique des dérivés de la quinoléine

La **Quinine** 1, a été découverte au Pérou au 19^{ème} siècle, elle a été utilisée contre la fièvre tierce. Les jésuites ont rapporté son usage par les Incas pour soulager la malaria. Ce n'est qu'en 1820 que la substance active fut isolée, sa structure fut décrite un siècle plus tard. La quinine inhibe la protéase, enzyme responsable de la dégradation des acides aminés de l'hémoglobine. Cependant, elle est toxique pour le système nerveux. Des recherches ont été menées pour préparer des analogues n'ayant pas cet effet : la **Chloroquine**⁴ 3 et la **Méfloquine** 4⁵

La **Quinidine** 2, énantiomère de la quinine 1, est un régulateur du rythme cardiaque. C'est une substance anti-arythmique⁶. Le sulfate de quinidine est employé dans le traitement des tachycardies et de l'arythmie.

La **chloroquine** 3 a été décrite en Allemagne en 1939. C'est un anti-paludisme efficace utilisé sur quelques plasmodiums.

La **Méfloquine 4**, commercialisée sous le nom LARIAM, est un agent antimalarique très efficace mais plus toxique ⁷. Plusieurs antimalériques ont été préparés tel la **Mépacrine 5**, médicament très efficace contre la malaria malgré ses effets secondaires: nausée, couleur jaune de la peau,... ⁸

Méfloquine

Mépacrine

D'autres composés à noyau quinoléique ont prouvé leur efficacité en tant que bactéricides ou antifongiques. Le Nitroxoline (8-hydroxy-5-nitroquinoléine) ou Nibiol **6**, est un agent antibactérien et antifongique utilisé dans le traitement des infections urinaires. En thérapeutique vétérinaire, il est prescrit comme antiseptique urinaire des voies génitales et comme anti-infectieux intestinal. ⁹

Nibiol

Les composés quinoléiques sont des systèmes hétérocycliques composé **8** qui rentrent dans la structure d'une large variété de produits naturels. Ils possèdent des propriétés pharmacologiques intéressantes par exemple antimicrobiens et antitumorales. ¹¹ Un bon nombre de dérivés de la quinoléine tels que les aminoquinoléines, montrent des activités biologiques intéressantes, par exemple le N-[5,7-bis(trifluoroacetyl)-8-quinoly]glycinate **7** est un agent antimalarique ¹⁰.

N-[5,7-bis(trifluoroacetyl)
-8-quinolyl] glycinate

1H-pyrolo[3,2-h]quinoléine

La **luotonin A** 9 et la **luotonin B** 9 sont de nouveaux alcaloïdes quinoléiques isolés de la partie aérienne du *Peganum nigellastrum* lequel est utilisé en médecine traditionnelle chinoise dans le traitement des rhumatismes et des inflammations. La **luotonin A** a prouvé une activité cytotoxique envers les cellules P-300 ¹²

Luotonin A: R=H
Luotonin B: R: OH

Cryptotackieine 10 et Cryptosanguinolentine 11 sont des produits naturels structurellement et bio synthétiquement reliés, qui ont été isolés à partir du "*Cryptolepis sanguilenta*", un arbre en Afrique qui a été utilisé en médecine traditionnelle comme antimalarique. La Cryptotackieine a montré une activité antispasmodique forte, tandis que la Cryptosanguinolentine est un antimicrobien. ¹³

Cryptotackieine

Cryptosanguinolentine

Les dérivés de la benzoquinoléine possèdent une activité large et diversifiée dans le domaine biologique et plus particulièrement dans les domaines pharmacologique et thérapeutique ¹⁴, comme le 4-(2-(N, N-diméthylamino-éthylamino)benzo[h]quinoline-3-acide carboxylique éthyle ester **12** qui est un agent antitumoral.

12

4-(2-Diméthylamino-éthylamino)-benzo[h]quinoléine
-3- acide carboxylique éthyl ester

Des recherches menées au département de biologie au sein de l'université de Constantine ont montré que le composé **14** possède un potentiel immunomodulateur *in vivo* et qu'il stimule les macrophages de la muqueuse ainsi que d'autres cellules telles que les lymphocytes ¹⁵. Il a été démontré également, que le 2-chloro-3-formyl-7-méthylquinoléine (substance **13**) possède de bonnes propriétés antioxydantes ¹⁶, alors que son analogue α, β insaturé, le 1-phenyl [3- (2chloro7-methylquinoly)] 2- propen-1-one (substance 14) n'en possède pas.

13

2-chloro-3-formyl-7-méthyl quinoléine

14

1-phenyl[3-(2-chloro-7-méthylquinoly)]2-propène
-1-one

I-3- Les méthodes de synthèse des dérivés de la quinoléine

L'importance des dérivés de la quinoléine dans différents domaines et en particulier en chimie et en biologie a conduit au développement de nombreuses méthodes pour leurs préparations. Les dérivés de la quinoléine sont souvent préparés avec facilité. Il existe un nombre considérable de méthodes de synthèse. Les méthodes développées pour préparer de nouvelles molécules, dérivés de quinoléine sont variées, nous décrivons les principales dans ce qui suit.

La première synthèse de quinoléine a été réalisée par Z. D. M. **Skraup** en 1880¹⁷, elle consiste à faire réagir l'aniline, l'acide sulfurique, le glycérol et un oxydant doux, à une température supérieure à 100°C, cette réaction peut devenir très violente. La réaction est illustrée dans le schéma qui suit (**Schéma 1**)

Schéma1

La synthèse de **Doebner-von Miller** est une variante de celle de **Skraup**, c'est une réaction entre une arylamine et un aldéhyde ou une cétone α, β -insaturés. Dans la réaction de **Doebner**¹⁸ et **von Miller**, les aldéhydes ou cétones α, β -insaturés sont directement mis en réaction avec les dérivés de l'aniline. La réaction est représentée dans le schéma suivant (**Schéma 2**).

Schéma 2

La synthèse de **Combes**^{18,19} est l'une des méthodes de préparation des dérivés de la quinoléine. Elle consiste à chauffer un mélange d'un β -dicétone ou d'un aldéhyde β -cétonique avec des arylamines à 100°C, en présence d'acide fort. La réaction est représentée par le **Schéma 3**.

Schéma 3

La synthèse de **Friedlander**²⁰ et **Coll.** est une condensation, dans un milieu basique, d'un composé possédant une fonction carbonyle et un dérivé de l'*o*-aminobenzaldehyde ou l'*o*-aminoacétophénone. Les bases de Schiff ainsi formées, seront cyclisées en dérivés quinoléiques différemment substituées selon le schéma 4, suivant :

Schéma 4

La synthèse de **Pfitzinger**²¹ est une modification de la méthode de **Friedlander**. Elle est réalisée dans un milieu basique générant l'ion *o*-aminobenzoylformiate. Ce dernier réagit avec un dérivé carbonyle pour produire la 4-carboxyquinoléine. La séquence réactionnelle est résumée dans le schéma ci-dessous²²(Schéma 5).

Schéma 5

Les dérivés quinoléiques peuvent être préparés par une extension de cycle. Le 2-méthylindole est transformé en dérivés quinoléiques par l'action d'un halogénure d'alkyle (équations 1 et 2) ou par l'action de EtONa dans le chloroforme (équation 3). Les séquences réactionnelles sont résumées dans le schéma suivant N° = 6. ²³

schéma 6

E. Boston ²⁴ a préparé des dérivés de la quinoléine en faisant réagir l'E-ethoxy acryloyl chloride avec 4-bromoaniline. L'amide obtenu est cyclisé en présence de l'acide sulfurique pour donner 6-bromoquinol-2-one, comme le montre le Schéma N° = 7.

Schéma 7

La méthode classique pour la préparation de la quinoléine est la procédure de **Skraup**. Cependant, elle exige une grande quantité d'acide sulfurique à une température supérieure à 150°C, et la réaction est souvent violente.

Brindaban²⁵ et *coll.* ont rapporté un procédé simple et efficace pour la synthèse des dérivés de la 4-alkyl quinoléines par la réaction, dite 'pot pote', des dérivés de l'aniline avec des alkyl vinyle cétones sur un support solide qui est le gel de silice, en présence de InCl₃. La séquence réactionnelle est représentée dans le **schéma 8**.

R = H, O-Me, Ph.

R₁ = R₂ = R₃ = H, Me, Ph

Schéma 8

Une synthèse efficace a été développée pour l'obtention de la quinoléine substituée à partir d'aniline correspondant. Le traitement de **1** dans l'ester d'acide formique en présence du Palladium comme catalyseur donne les 2- aryle ou le 2- vinylquinoléines avec de bons rendements²⁶, comme le montre le **Schéma 9**.

R = aryle, vinyl

Schéma 9

La méthode de **Otto Meth-Cohn** et *Coll.* est l'une des méthodes largement utilisée pour la préparation des dérivés de la quinoléine.²⁷ C'est une synthèse très efficace rencontrée dans la préparation de plusieurs produits à noyau quinoléique. L'action de réactif de Vielsmeier POCl₃/DMF sur des anilides donne les dérivés de la quinoléine différemment substituée.²⁸ (**Schéma 10**)

Schéma 10

Cette voie d'accès a été largement utilisée dans le Laboratoire des Produits Naturels d'Origine Végétale et de Synthèse Organique du département de Chimie de la faculté des Sciences de l'Université Mentouri-Constantine, pour la préparation de nouveaux dérivés quinoléiques, par exemple 2-chloro-6,7-déoxyméthyl-3-formylquinoléine et 2-chloro-7-fluoro-3-formylquinoléine²⁹. (**Schéma 11**)

2-chloro-6,7-déoxyméthyl-3-formylquinoléine

2-chloro-7-fluoro-3-formylquinoléine

Schéma 11

Cette méthode constitue une voie simple et efficace utilisée pour la préparation des dérivés quinoléiques.

Les dérivés de l'acétanilides sont préparés par une réaction de condensation d'un dérivé de l'aniline et l'anhydride acétique en présence d'acétate de sodium et de l'acide chlorhydrique. L'action du réactif de Vielsmeier sur les dérivés de la N-phénylacétamide donne accès aux dérivés quinoléique possédant un groupement formyle en position 3. Ceci est illustré dans le **Schéma N° = 12**.

Schéma 12

I-4- Conclusion

Dans ce premier chapitre, nous avons donné un bref aperçu sur l'importance des dérivés de la quinoléine, qui occupent une place appréciable dans plusieurs domaines, précisément sur les plans pharmaceutique et thérapeutique.

Nous avons fait un rappel bibliographique sur les méthodes de synthèse de ces dérivés parmi lesquelles nous avons sélectionné celle décrite par Otto Meth-Cohn ^{27,28}, Pour l'obtention des composés 2-chloro-3-formylquinoléines qui sont considérés comme des produits de départ importants pour l'obtention d'autres substances prometteuses comme nouveaux remèdes.

Bibliographie

Bibliographie

- 1-M. Schroderet, « *Pharmacology* », **1989**, Vol. I, p. 636-747.
- 2- H. Breuer, «*Atlas de la Chimie*», Ed. 1, **2000**, p. 411.
- 3-W.Solomon, «*The Chemistry of Alkaloides*», Van Nostrand Renihold. Ed. S. W. Pelletie, New york, **1970**, p. 301.
- 4- D. Barton, D. Ollis, «*Comprehensive Organic Chemistry*», First edition , Vol. IV, **1979**, p. 160-190.
- 5-N.I.Alling, M.P.Canh, D.C.De joigh, C.R.Johnson, N.A.Lebel, C.L.Stevens,"*Chimie Organique*", éd.McGrawn-hill, TomeIII, **1984**, p.774
- 6- N.I.Alling, M.P.Canh, D.C.De joigh, C.R.Johnson, N.A.Lebel, C.L.Stevens,"*Chimie Organique*", éd.McGrawn-hill, Tome III, **1975**, p.774
- 7-P.J.Schlagenhauf,*Travel.Med*, **1999**, 6, 122
- 8-I.L.Finar,"*Organic Chemistry*", 4e Eddition., **1969**,p.776
- 9-F.Dorvault,"*L'officine*", XXIe Eddition, **1982**, p.346.
- 10- J.Bunnett, F.E. Zahler, *R.E.Chem.Rev*, **1951**, 49, 273.
- 11- O.Etsuji , T.Norikado , *Synlett*,**1999**, 2, 210-211.
- 12- Z.Mahj, .Y.Hano,T. Nomura,Y. Chen, *J. Heterocycles*, **1997**, 46, 541.
- 13-P. M.Fresneda, P. Molinam, S.Delgado, *Tetrahedron Letters*, 40, **1999**, 7275-7278.
- 14-A.Boyd, G.W.Mackay, *J.Chem.Soc.1*, **1999**, 16, 2315-2321.
- 15-K.Laalaoui,"*Thèse de Doctorat d'état*", Université Mentouri-Constantine, **2003**.
- 16-K.Laalaoui,D.Bendjeddou,H.Menasra,A.Belfaitah,S.Rhouati, D.Satta, *J.Egypt.Ger.Soc. Zool*, **2003**,95.
- 17-R.Milcent,"*Chimie organique hétérocyclique*"EDP.Science.**2003**, p.419.
- 18-N.J.Tom, E, M.Ruel, *synthèse*, **2001**, 9, 1351-1355.
- 19- R.Milcent,"*Chimie organique hétérocyclique*"EDP.Science, **2003**, p.415
- 20- R.Milcent,"*Chimie organique hétérocyclique*"EDP.Science, **2003**, p.417
- 21-W.Pfilzinger, *J.Prakt.Chem*, **1886**, 33,100
- 22-M.A.Alonso,M.Blanco, C.Avendano, J.Carlo,"*Heterocycles*", Vol-36, N°10, **1993**,231-232
- 23- R .Milcent,"*Chimie organique hétérocyclique*" EDP .Science, **2003**, 423
- 24-E.Baston, A.Paluszczark, R.W.Hartmann.*EUR.J.Med.Chem*, 35, **2000**, 931-940
- 25-B. C.Ranu, A. Hajra, U. Jana, *Tetrahedron Letters*, 41, **2000**, 531-533

- 26-S.Cacchi, G. Fabrizi, F.Marinelli, *Synlett* , 4, **1999**, 401- 404
- 27-O.Meth-Cohn, B.Narine, B.Tarnouwski, *J.Chem.Soc.Perkin trans I*, **1981**, 1520
- 28- O.Meth-Cohn, S.Rhouati, B.Tarnouwski.*J.C.S.Perkin I*,**1981**, 1537
- 29-A.M.Bouraiou, "*Mémoire de Magistère*", université Mentouri-Constantine, **2004**.

Chapitre 2
Synthèse des Alcools
Quinoléiques

II-1-Introduction

Les alcools sont des composés très importants en chimie organique. Les différentes applications de ces molécules ont suscité un intérêt grandissant de la part des chimistes, traduit par la recherche de nouvelles molécules et méthodologies pour leur synthèse.

Les recherches biologiques et pharmacologiques, sur les quinoléines substituées surtout en position 2, montrent que ces dernières possèdent une activité biologique très intéressante. Notre objectif est de préparer de nouvelles molécules possédant le noyau quinoléique substitués en position 2 et 3, qui seront soumises par la suite à une évaluation de l'activité biologique. La procédure établie consiste à l'utilisation des réactions simples et faciles de mise en œuvre. Cette synthèse ne nécessite pas des réactifs très élaborés.

Dans le présent chapitre, nous allons présenter l'importance biologique ainsi que les méthodes de préparation des dérivés d'alcools quinoléiques. Nous nous limiterons à la description des méthodes les plus importantes.

Les alcools quinoléiques sont préparés par une série de réactions: la première est une protection de la fonction aldéhyde, qui sera suivie par une substitution nucléophile et une déprotection et enfin une addition de réactif de Grignard selon le **schéma N° =1**

Schéma 1

II-2-Intérêt biologique des dérivés quinoléiques substitués en position 2 et 3

Les composés quinoléiques substitués en position C₂ et C₃ occupent une place très importante en chimie. Ils sont largement utilisés dans le domaine pharmaceutique.

Dans ce qui suit, nous présenterons quelques exemples d'utilisation des dérivés quinoléiques substitués en position C₂ et C₃.

Le composé, 2-(aminoalkoxy) quinoléine **1** est très utilisé comme psychotrope, il agit également sur le système nerveux central.¹

R= alkyl, cyclopropyl, Ph

Des tests, " *in vitro* ", ont prouvé que le 7-(2-isopropyl-4-(4-fluorophényl)-3-quinoly) 3,5-dihydroxy-6-heptanoate de sodium **2**, possède une activité inhibitrice de l'enzyme 3-hydroxy-3-méthylglutaryl-coenzyme A (HMG-CoA) Réductase, ce qui limite la biosynthèse du cholestérol.²

2

7-(2-isopropyl-4-(4-fluorophényl)-3-quinoly) 3,5-dihydroxy-6-heptanoate de sodium

Y.L.Chen et *coll.* ³ ont étudié l'effet anti-inflammatoire des dérivés 2-(furan-2-yl)-4-(phénoxy) quinoléine **3** et **4**. Ces derniers ont montré un pouvoir d'inhibition de la formation de TNF- α (substance de l'inflammation).

D'autres composés comportant le noyau de la quinoléine sont utilisés dans le domaine de l'agrochimie. Nous citons comme exemples :

-l'**Imazaquine** **7** qui est un herbicide très puissant occupant un large spectre d'action.

-le **Quinacétol** **5** et l'**Halacrinat** **6** sont parmi les antifongiques les plus employés en agriculture.

Une étude a montré que le 2-[[2-(diméthylamino) éthyl]thio]-3-phénylquinoléine **8** est un antagoniste des récepteurs (5-HT₂) avec une faible affinité envers les récepteurs d'autres neurotransmetteurs ⁵.

2-[[2-(diméthylamino) éthyl] thio]-3-phényl-quinoléine

Les auteurs décrivent la synthèse et l'évaluation de l'activité antibactérienne "*in vitro*" de nouvelles 2, 4-diamino-5- (quinol-3-yl) méthylpyrimidines. Le composé le plus actif est le 2, 4-diamino-5- (triméthoxy-5, 6, 7- quinol-3-yl) méthylpyrimidines (Composé **9**) qui présente une notable synergie avec le sulfaméthoxazole vis-à-vis des germes à Gram⁺ et à Gram⁻. ⁶

Les antagonistes du récepteur (NMDA) (N-méthyl D-aspartate) ont un grand intérêt pour leur utilisation potentielle comme agents thérapeutiques surtout contre l'épilepsie, le (R) α -amino-3-(phosphonométhyl)-2-quinoléine propanoïque **10**, possède également une activité analgésique. ⁷

Le 2-(1-pipérazine) quinoléine **11**, est un agoniste des récepteurs 5-HT avec une affinité remarquable pour les deux types de 5H₁ et 5H₂.⁸

2-(1- pipérazine) quinoléine

Les Pyrolo [3, 2-c] quinoléines **12** sont des composés très importants. Ils ont montré diverses activités biologiques telles que l'inhibiteur de H⁺/K⁺ ATPase, ils sont aussi utilisés comme agents anti-inflammatoires⁹

R₄ = butyl, méthyl, phényl

R₃ = méthyl, CH₂OH

Les quinoléines substituées en position 2 (composé ci-dessous) ont, à côté de la propriété anti protozoaires, un pouvoir antirétroviral pour les cellules transformées HIV-1 et HTLV-1.¹⁰

13

L'acide 4-hydroxy-quinoléine-2-carboxylique méthyl ester, a été obtenu à partir de la méthode de **Conrad et Limpach**¹¹, tandis que l'activité biologique de ce produit **14** empêche l'activité du canal d'ATP-K⁺ de la membrane pancréatique des cellules β .

14

R = Me, Ph

D'autres molécules à noyau quinoléique tels que les composés ci-dessous **15**, ont été synthétisées à partir des réactions radicalaires dans des conditions très élaborées, mais les recherches pharmacologiques " *in vivo*" n'ont pas encore prouvé leur efficacité biologique.¹²

15

2-(3,4-bis-benzyloxy-5-benzyloxymethyl-tetrahydro-furan-2-yl)-4-méthyl-quinoléine

Des recherches biologiques et toxicologiques sur le composé ci-dessous **16** montrent qu'il possède une activité biologique fort intéressante. Il est utilisé comme antibiotique glycopeptidique.¹³

16

Du point de vue pharmaceutique, les dérivés de 2-méthoxy-3-phénylquinoléine **17**, possèdent une activité contre la prolifération des cellules tumorales¹⁴ qui est très efficace.

17

R= OH, alkyl, aryle, ester

NK-104 (pitavastatin calcium : monocalcium bis [(3R, 5S, 6R) -7- (2-cyclopropyle - 4-(4-fluorophenyl)-3-quinolyl) -3,5-dihydroxy-6-heptenoate] **18** possède une activité antilipidimique.¹⁵

NK-104

18

Les maladies parasitaires, en particulier la leishmaniose, tuent des centaines de milliers de personnes chaque année dans le monde, principalement dans les pays du sud. La forme la plus sévère de leishmaniose (la forme viscérale ou "Kala-azar"), affecte environ 500000 personnes par année et se révèle mortelle en l'absence de traitement ¹⁶. Ainsi une nouvelle alternative pour de nouveaux médicaments et composants a été adoptée. Des études ethnopharmacologiques ont été entreprises dans ce sens par des chercheurs de l'IRD en Amérique du sud, notamment. Ces derniers, en collaboration avec des chercheurs du CNRS ^{17, 18}, ont étudié et découvert des alcaloïdes de la famille chimique des quinoléines, dotés de propriétés antiparasitaires. Ces molécules, obtenues par synthèse chimique, sont des analogues de quinoléines isolées initialement d'une plante bolivienne, *Galipea longiflora* (*Rutaceae*). Des expérimentations menées sur des souris infectées par la leishmaniose viscérale ont montré que les quinoléines **19** à **21** étaient efficaces, pour traiter cette forme grave de la maladie.

Une centaine de quinoléines ¹⁹ substituées ont été testées « *in vitro* » sur différents parasites, notamment ceux responsables des formes cutanées et viscérales de la leishmaniose, puis sur deux rétrovirus, le VIH (responsable de la pandémie du sida) et le HTLV-1 (Virus de la leucémie des cellules T humaines). Le groupe de **Alain Fournet** montre que les quinoléines ci-dessous **22** à **25** ont été capables de bloquer, *in vitro*, la réplication du rétrovirus VIH, sans toutefois s'avérer toxiques vis-à-vis des cellules hôtes. D'autres se sont révélées actives contre HTLV-1, l'une étant capable d'inhiber, à très faible dose, la prolifération du rétrovirus en diminuant de 76% la charge virale.

Caijo Frédéric²⁰ a préparé deux dérivés quinoléiques **26** et **27**, le 8-hydroxy-8-(2-pentyloxyquinoléine-3-yl) oct-5-ynoate de sodium, et le 8-hydroxy-8-(2-méthoxyquinoléine-3-yl) oct-5-ynoate de sodium, qui sont des analogues du 8 (S)-HETE et il a étudié leur interaction avec les PPARs (Proliferator Activated Receptors), leur rôle semble être prépondérant dans le stockage des lipides. Ces molécules ont donné des résultats très encourageants in vitro sur les tests PPARs comparées aux antidiabétiques.

II-3 - Résultats et discussion :

L'intérêt suscité par cette classe de composés et leur efficacité dans le domaine thérapeutique, biologique et pharmacologique... Nous a amené à établir une synthèse de nouveaux alcools quinoléiques qui sont inconnus dans les travaux de la littérature, et de les soumettre à une étude d'activité biologique par la suite, dans le but d'aboutir à de nouveaux principes actifs.

Notre approche à ces alcools est représentée par le **Schéma Rétrosynthétique1**

Schéma 1

1) Préparation des dérivés de 2-chloro-3-formylquinoléines

Au cours de ce travail nous avons procédé à la synthèse de quelques dérivés du 2-chloro-3-formylquinoléines dont un, est inédit, selon la méthode décrite par O. Meth-Cohn. Les dérivés de 2-chloro-3-formylquinoléines sont obtenus par une réaction de cyclisation

des acétanilides correspondants en présence du réactif de Vielsmeier (DMF/POCl₃). La réaction est représentée dans le schéma ci-dessous :

Schéma 2

2) - Protection de la fonction aldéhyde

L'essai de la substitution de l'atome de chlore en position 2 des dérivés du 2-chloro-3-formylquinoléine par un nucléophile peut être empêché par une réaction parallèle entre le nucléophile et la fonction aldéhyde en raison de la réactivité très élevée de cette dernière. Nous avons donc procédé, dans un premier temps, à la protection de la fonction aldéhyde sous forme d'acétal par l'utilisation de l'ortho formiate de méthyle. La réaction est résumée dans le (Schéma 3) suivant :

- 2-1** : R₁ = R₂ = R₃ = R₄ = H
- 2-2** : R₁ = CH₃, R₂ = R₃ = H
- 2-3** : R₁ = R₂ = H, R₃ = CH₃
- 2-4** : R₁ = R₃ = H, R₂ = OCH₃
- 2-5** : R₁ = R₂ = H, R₃ = OCH₃

Schéma 3

- Les produits obtenus ont été purifiés par chromatographie sur colonne de gel de silice, en utilisant comme éluant : acétate d'éthyle / éther de pétrole avec des proportions 10 / 90.

- Les propriétés physiques des composés **2** sont rassemblées dans le **tableau 1**

Tableau 1 : les dérivés de 2-chloro-3-diméthoxyméthyl-quinoléine

Acétals	Structure	Tfus. °C	Rdt. (%)
2-1		61	81
2-2		84	80
2-3		64	94
2-4		78	75
2-5		86	74

Toutes Les données spectroscopiques des différents composés distenus : RMN ¹H, RMN ¹³C et Infra-rouge, sont en accord avec les structures proposées.

Les valeurs des déplacements chimiques des principaux protons sont rassemblées dans le **tableau N° 2** suivant :

Acétal	Structure	Déplacement chimique des protons en (ppm)				
		$\underline{\text{CH}}(\text{OMe})_2$	OCH_3	$\underline{\text{H}}_4$	$\underline{\text{CH}}_3$	$2(\text{OCH}_3)$
2-1		5,73	-----	8,42	-----	3,45
2-2		5,73	-----	8,32	2,52	3,43
2-3		5,70	-----	8,68	2,78	3,43
2-4		5,70	3,94	8,32	-----	3,43
2-5		5,70	3,93	8,31	-----	3,44

Tableau 2

L'analyse des spectres **RMN ¹H** des composés obtenus, montre les deux signaux caractéristiques attendus. Un signal singulet à champ fort entre 3,43 et 3,45 ppm correspondant aux protons des méthyles du groupement 2(OCH₃) et un autre signal sous forme d'un doublet dans l'intervalle 5,70 -5,73 ppm correspondant au proton $\underline{\text{CH}}(\text{OMe})_2$ de l'acétal.

Tous les spectres présentent des multiplets dans la région 7,66-8,68 ppm correspondants aux protons aromatique H₄, H₅, H₆, H₇ et H₈.

On remarque que les groupements méthyles des composés **2-2** et **2-3** apparaissent, sous forme d'un signal singulet, entre 2,50 - 2,80 ppm, tandis que le groupement méthoxy de composé **2-4** et **2-5** apparaît entre 3,90-3,94 ppm, sous forme de singulets.

3)- Substitution du chlore en position 2 des quinoléines

Après la protection de la fonction aldéhyde dans l'étape précédente. Nous avons procédé à la substitution du chlore en position 2 sans aucun risque réactionnel.

Dans cette étape nous avons fait réagir l'alcool allylique en présence de l'hydruure de Sodium dans le **DMF** avec le 2-chloro-3-formyl-quinoléine pour conduire aux éthers attendus comme le montre le Schéma réactionnel N° =4.

3-1 : $\text{R}_1 = \text{R}_2 = \text{R}_3 = \text{R}_4 = \text{H}$

3-2 : $\text{R}_1 = \text{CH}_3$, $\text{R}_2 = \text{R}_3 = \text{H}$

3-3 : $\text{R}_1 = \text{R}_2 = \text{H}$, $\text{R}_3 = \text{CH}_3$

3-4 : $\text{R}_1 = \text{R}_3 = \text{H}$, $\text{R}_2 = \text{OCH}_3$

3-5 : $\text{R}_2 = \text{R}_3 = \text{H}$, $\text{R}_1 = \text{OCH}_3$

Schéma 5

L'explication de l'obtention de ces produits **3** est schématisée par le mécanisme proposé ci-dessous, qui passe par deux étapes :

1- Formation de l'alcoolate allylique par l'action de NaH à 0°C dans le diméthyle formamide.

2- Une substitution nucléophile de 2^{ème} ordre sur la quinoléine selon le mécanisme suivant :

Schéma 5

Les produits obtenus sont purifiés par chromatographie sur gel de silice, en utilisant comme éluant: acétate d'éthyle / éther de pétrole avec des proportions 5 / 95.

Les propriétés physiques des composés 3 sont rassemblées dans le **tableau 3**.

Tableau 3 : les dérivés de 2-allyloxy-3-diméthoxyméthyl-quinoléine

Composé	Structure	Rdt (%)
3-1		85
3-2		78
3-3		88
3-4		74
3-5		79

On remarque dans ce tableau que le rendement est très élevé, et les produits obtenus sont tous des huiles.

Les données de résonance magnétique nucléaire des protons caractéristiques de ces composés sont en accord avec les structures proposées : ceci concerne surtout les déplacements chimiques des protons de la double liaison de l'alcool allylique, des protons de groupement acétal qui sont rassemblés dans le **tableau N° 4** suivant :

Composé	Structure	Déplacement chimique des protons en ppm							
		CH(OMe) ₂	CH ₃	(OCH ₃) ₂	OCH ₂	OCH ₃	H _{trans}	H _{cis}	H _{C=CH2}
3-1		5,70	-----	3,42	5,07	-----	5,26	5,46	6,16
3-2		5,69	2,47	3,42	5,05	-----	5,25	5,45	6,18
3-3		5,70	2,39	28	5,00	-----	5,23	5,44	6,18
3-4		5,69	-----	3,42	5,07	3,93	5,31	5,50	6,18
3-5		5,69	-----	3,42	5,04	3,89	5,25	5,45	6,16

Tableau 4

Les spectres RMN¹H des composés de 2-allyloxy-3-diméthoxyméthyl-quinoléine présentent tous, un signal dans la zone du champ faible dans tous les cas entre 8,14- 8,46 ppm, ceci correspond au proton H₄, il est le plus déblindé des protons aromatiques. La région entre 7,08-7,82 ppm correspondant aux protons aromatiques H₅, H₆, H₇ et H₈.

Un signal doublet dédoublé triplet dans l'intervalle 6,16-6,19 ppm correspondant au proton H_{C=CH₂}, les deux protons de la double liaison ne sont pas équivalents, et chacun résonne dans une zone plus ou moins éloignée de l'autre, H_{trans} il apparaît sous forme d'un doublet dédoublé triplet dans l'intervalle 5,45-5,50 ppm, mais H_{Cis} apparaît entre 5,23-5,31 ppm. Suivi d'un signal qui apparaît dans l'intervalle 5,00-5,07 ppm, ceci correspond aux protons OCH₂.

Un signal singulet à champ fort entre 3,40-3,43 ppm correspondant au proton 2(OCH₃) et un autre signal doublet dans l'intervalle 5,69-5,70 ppm correspondant au proton CH(OMe)₂.

En ce qui concerne les groupements méthyles et méthoxyles liés aux noyaux quinoléiques, ils apparaissent sous forme de singulets vers la zone du champ fort à 2,39-2,47 ppm et 3,89-3,93 ppm.

4)- Déprotection des fonctions aldéhydes

La prochaine étape nécessite la libération de la fonction aldéhyde afin de procéder à son alkylation, ceci nous amène à déprotéger la fonction aldéhyde des différentes quinoléines, en les chauffant à reflux dans un mélange de THF et d'eau distillée pendant 1 heure en présence d'une quantité catalytique d'acide paratoluènesulfonique pour conduire aux aldéhydes éthers attendus, comme le montre le **Schéma 6**

Schéma 6

Les produits obtenus sont purifiés par chromatographie sur colonne de gel de silice, en utilisant comme éluant l'acétate d'éthyle et l'éther de pétrole avec des proportions 10 / 90. Le produit **4** étant recristallisé dans l'éther de pétrole.

Les propriétés physiques des dérivés 2-allyloxy-3-formyl-quinoléines ainsi que les rendements réalisés (calculés après la purification) sont rassemblées dans le **tableau 5**.

Tableau 5 : les dérivés de 2-allyloxy-3-formyl-quinoléines

Composé	Structure	Tfus(°C)	Rdt(%)
4-1		68	69
4-2		89	80
4-3		86	75
4-4		94	74
4-5		86	78

Les structures des dérivés de 2-allyloxy-formylquinoléines sont confirmées par les méthodes spectroscopiques usuelles Infra-rouge RMN¹H (voir Tableau 6 ci-dessous)

	Structures	Déplacements chimiques en ppm						
		OCH ₂	H _{cis}	H _{trans}	H _{C=CH2}	CHO	CH ₃	OCH ₃
4-1		5,13	5,33	5,49	6,20	10,52	-----	-----
4-2		5,11	5,32	5,49	6,19	10,51	2,50	-----
4-3		5,10	5,33	5,50	6,20	10,47	2,78	-----
4-4		5,10	5,30	5,49	6,20	10,47	-----	3,97
4-5		5,13	5,33	5,49	6,20	10,52	-----	3,98

Tableau 6

Les spectres **RMN ¹H** permettent d'observer les caractéristiques des protons ; Un signal singulet à champ faible entre 10,47 et 10,50 ppm correspondant au proton du carbone porteur de la fonction aldéhyde, ainsi, on remarque que les deux protons de OCH₂ apparaissent entre 5,10-5,13 ppm.

Alors que les déplacements chimiques des protons de la double liaison H_{cis}, H_{trans}, apparaissent presque les mêmes dans tous les cas. Chacun résonne dans une zone plus ou moins éloignée de l'autre, H_{trans} apparaît sous forme d'un doublet dédoublé triplet dans l'intervalle 5,49-5,50 ppm, H_{cis} apparaît entre 5,30-5,33 ppm. Ainsi le groupe méthyle et le méthoxy apparaissent dans les champs forts sous forme d'un signal singulet.

5) - Alkylation de la fonction aldéhyde

La dernière étape de cette synthèse est l'obtention des alcools quinoléiques recherchés pour leur intérêt synthétique en chimie organique. Nous avons procédé à l'alkylation des fonctions aldéhydes obtenues dans l'étape précédente par l'iodure de méthyle magnésium dans le THF pour conduire aux alcools quinoléiques attendus avec de très bons rendements $\geq 85\%$ comme le montre le **Schéma 7** suivant :

Schéma 7

En 1984, **P.Mosset**²¹ décrit la synthèse d'antagonistes de l'action des leucotriènes, substances biologiquement actives qui possèdent un groupe OH ou OCH₃ en α du système triénique comme le montre le **schéma 8** ci-dessous et ceci par l'utilisation d'un complexe butadiène fer-tricarbonyle comme substrat de départ.

R = CH₃, H

Schéma 8

Les Alcools obtenus sont purifiés par chromatographie sur colonnes de gel de silice, en utilisant comme éluant l'acétate d'éthyle et l'éther de pétrole avec des proportions 20 / 80.

Les propriétés physiques des dérivés de 1-(2-allyloxy-quinolin-3-yl)-éthanol ainsi que les rendements réalisés (calculés après purification) sont rassemblés dans le **tableau 7**.

Tableau 7 : les dérivés de 1-(2-allyloxy-quinolin-3-yl)-éthanol

	Structure	Tfus(°C)	Rdt(%)
5-1		74	91
5-2		76	85
5-3		78	85
5-4		77	84
5-5		72	76

-On remarque ici que les rendements sont très élevés. Toutes les données spectroscopiques sont en accord avec les structures des produits obtenus et proposées. Les données spectroscopiques sont regroupées dans la partie expérimentale.

Composés	Structures	Déplacement chimique en ppm							
		OCH ₂	CH ₃ -CH-C ₃	HC-C ₃	H _{CIS}	H _{trans}	H _{CH=CH2}	CH ₃	OCH ₃
5-1		5,07	1,60	5,16	5,29	5,45	6,17	-----	-----
5-2		5,06	1,52	5,14	5,29	5,44	6,16	2,42	-----
5-3		5,09	1,49	5,16	5,27	5,49	6,19	2,35	-----
5-4		5,06	1,50	5,14	5,30	5,45	6,17	-----	3,93
5-5		5,07	1,52	5,14	5,38	5,54	6,17	-----	3,98

Tableau 8

Les spectres RMN ^1H permettent de reconnaître les protons caractéristiques de ces molécules :

Un signal doublet caractéristique du proton $\text{CH}_3\text{-CH-C}_3$ qui résonne dans l'intervalle 1,49 et 1,60 ppm.

Les déplacements chimiques du proton CH en C_3 , apparaissent au champ moyen dans l'intervalle 5,14-5,16 ppm sous forme d'un quadriplet doublet.

Les deux protons de OCH_2 apparaissent entre 5,06-5,08 ppm sous forme d'un doublet dédoublé dédoublé.

Cependant, les déplacements chimiques des protons de la double liaison H_{cis} , H_{trans} , $\text{H}_{\text{C=CH}_2}$ ont presque la même allure dans tous les cas. Le H_{trans} apparaît sous forme d'un doublet dédoublé triplet dans l'intervalle 5,40-5,49 ppm, mais H_{cis} apparaît entre 5,28-5,30 ppm, alors que les groupements méthoxyles résonnent, comme attendu, aux environs de 4,00 ppm. Les groupements méthyles donnent un signal singulet à champ fort entre 2,35-2,42 ppm.

II-4- Conclusion

Dans cette deuxième partie nous avons cité quelques exemples portant sur l'intérêt biologique des substances à noyau quinoléique substitués en position 2 et 3, dans les domaines pharmaceutique et médical. Aussi, nous avons procédé à la préparation des alcools quinoléiques d'une manière simple et efficace, les rendements sont $\geq 85\%$, ceci dans le but de les tester sur le plan biologique.

Nous avons entamé cette synthèse par une réaction de protection de groupement aldéhyde des 3-formyl-quinoléine, avec l'ortho formiate de méthyle, puis une substitution nucléophile a été réalisée par l'attaque de l'alcoolate sodique de l'alcool allylique sur la position 2, suivi d'une déprotection en milieu acide pour libérer la fonction Aldéhyde et enfin l'alkylation de cette dernière par l'organomagnésien pour l'obtention des alcools attendus.

Les produits obtenus dans cette séquence, n'ont pas été synthétisés auparavant, il s'agit de produits originaux.

Partie Expérimentale

Partie expérimentale

a) Préparation des acétals

Mode opératoire

Dans un ballon de 100 ml équipé d'un Barreau magnétique et d'un réfrigérant ascendant, on introduit 1g (0.0052 mole) de 2-chloro-3-formyl-quinoléine et 1,72 ml soit (4 eq) de l'ortho formiate de méthyle, en solution dans 7 ml de méthanol. Le mélange réactionnel est chauffé à reflux pendant 8 heures. On neutralise avec 5 ml de carbonate de sodium Na_2CO_3 (1/3 N). Le mélange réactionnel est épuisé à l'acétate d'éthyle et lavé à l'eau distillée. Les phases organiques réunies sont séchées sur sulfate de sodium Na_2SO_4 , après filtration et distillation du solvant sous vide. Le produit brut de la réaction est purifié par colonne de chromatographie sur gel de silice en utilisant comme éluant un mélange d'acétate d'éthyle et l'éther de pétrole (10/90).

2-1: Synthèse de 2-chloro-3-diméthoxyméthyl-quinoléine

2-1

A partir de 1 g (0,0052mmol) de 2-chloro-3-formyl-quinoléine et 1 ml soit 1,2 eq de l'ortho formiate de méthyle en solution dans 7 ml de méthanol, on obtient 0,94 g de l'acétal **2-1**.

- Cristaux blancs.

- **Rdt** = 81%

-**CCM**: $R_f = 0,25$ (acétate / éther : 1/9)

-**Tfus** = 61°C

-I.R (KBr; $\nu \text{ cm}^{-1}$) : 2932-2825 (CH).

-R.M.N ¹H (400 MHz; CDCl₃) δ ppm : **8,42** (dd, 1H, J=0,9 Hz, H-C₄); **8,03** (ddd, 1H, J=8,5 Hz, J=1,1 Hz, J=0,7 Hz, H-C₈); **7,87** (dd, 1H, J=8,1 Hz, J=1,4 Hz, H-C₅); **7,75** (ddd, 1H, J=8,5 Hz, J=6,9 Hz, J=1,5 Hz, H-C₇); **7,58** (ddd, 1H, J=8,1 Hz, J=6,9 Hz, J=1,2 Hz, H-C₆); **5,73** (d, 1H, J=0,6 Hz, CH(OCH₃)₂); **3,45** (s, 6H, (OCH₃)₂).

-R.M.N ¹³C (100 MHz; CDCl₃) δ ppm : **149,00** (Cquat, C₂) ; **147,48** (Cquat, C_{4a}); **137,28** (H-C₄); **130,90** (H-C₇); **129,25** (Cquat, C_{8a}); **128,25** (H-C₈); **128,08** (H-C₅); **127,26** (H-C₆); **126,75** (Cquat, C₃); **100,40** (CH(OCH₃)₂); **53,90** (CH(OCH₃)₂).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour C₁₂H₁₂N O₂ Cl

[M⁺] : 237,0556 ; trouvée : 237,0545

2-2: 2-chloro-3-diméthoxyméthyl-6-méthyl-quinoléine

2-2

A partir de 1 g (0,0052 mmol) de 2-chloro-3-formyl-6-méthyl-quinoléine et 1,2 ml de l'ortho formiate de méthyle en solution dans 7 ml de méthanol, on obtient 1,14 g de l'acétal **2-2**.

- Cristaux blancs.

-Rdt = 94%

-CCM : Rf = 0,29 (acétate / éther 1/9)

-Tfus = 64°C

-IR (KBr; ν cm⁻¹) = 2941-2829 (CH)

-R.M.N ¹H (400 MHz; CDCl₃) δ ppm : **8,32** (dd, 1H, J=1,0 Hz, H-C₄); **7,92** (d, 1H, J=8,6 Hz, H-C₈); **7,62-7,60** (m, 1H, H-C₅); **7,56** (dd, 1H, J=8,6 Hz, J=1,9 Hz, H-C₇); **5,73** (d large, 1H, J=1,0 Hz, CH(OCH₃)₂); **3,43** (s, 6H, (OCH₃)₂); **2,52** (s, 3H, C₆-CH₃).

-R.M.N ¹³C (100 MHz; CDCl₃) δppm : 148,42(Cquat, C₂) ; 146,07(Cquat, C_{8a}); 137,28 (Cquat,C₃); 136,60 (H-C₄); 133,13 (H- C₇); 129,12(Cquat,C₆); 127,88 (H-C₈); 126,90 (H-C₅); 126,79 (Cquat, C_{4a}); 100,51 (CH (OCH₃)₂); 53,88(CH (OCH₃)₂); 21,59(C₆-CH₃).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour C₁₃H₁₄ N O₂ Cl
[M⁺] :251,0713 ; trouvée : 251,0714

2-3: 2-chloro-3-diméthoxyméthyl-8-méthyl-quinoléine

A partir de 0,5 g (0,0052mmol) de 2-chloro-3-formyl-8-méthyl-quinoléine et 0,7 ml de l'ortho formiate de méthyle en solution dans 5 ml de méthanol, on obtient 0,4 g de l'acétal **2-3**.

- Cristaux jaune clair.
- Rdt = 80, 5%
- CCM: Rf = 0,31 (acétate / éther 1/9)
- T_{fus} = 84°C

-IR (KBr;v cm⁻¹) : 2829-2932 (CH).

-R.M.N ¹H (400 MHz;CDCl₃) δ ppm : 8,68 (s large,1H, H-C₄); 7,79(d large,1H, J=8,1 Hz, H-C₅); 7,71 (ddq, 1H, J=7,2 Hz, J= 1,5 Hz, J= 0,9 Hz, H-C₇); 7,52 (dd,1H, J=8,1 Hz, J=7,2 Hz, H-C₆); 5,70(d,1H, J= 0,6 Hz CH(OCH₃)₂); 3,43 (s,6H,(OCH₃)₂), 2,78(s,3H,C₈-CH₃).

-R.M.N ¹³C (100 MHz; CDCl₃) δ ppm : 198,98(Cquat, C₂) ; 148,47(Cquat, C_{8a}); 140,41(H-C₄); 136,99 (Cquat, C₈); 133,66(H-C₇); 127,83(H-C₆) ; 127,56 (H-C₅);126,56(Cquat, C₃ouC_{4a});126,05(Cquat, C₃ ou C_{4a}); 100,51 (CH (OCH₃)₂); 53,88(CH (OCH₃)₂); 17,81(C₈-CH₃).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour C₁₃H₁₄ N O₂ Cl

[M⁺] : 251,0713 ; trouvée : 251,0714

2-4: 2-chloro-3-diméthoxyméthyl-7-méthoxy-quinoléine

2-4

A partir de 0,5 g (0,0018mmol) de 2-chloro-3-formyl-7-méthoxy-quinoléine et 0,8 ml de l'ortho formiate de méthyle en solution dans 6 ml de méthanol, on obtient 0,4 g de l'acétal **2-4**.

-Cristaux jaune clair.

- Rdt = 75%

-CCM: Rf = 0,25 (acétate / éther 1/9)

-Tfus = 91°C

IR (KBr;v cm⁻¹) = 2874-2845 (CH).

-R.M.N ¹H (400 MHz;CDCl₃) δ ppm : **8,32** (dd,1H, J=1,0 Hz, J= 1,0 Hz, H-C₄); **7,73** (d,1H, J=8,9 Hz, H-C₅); **7,35** (d, 1H, J=2,5 Hz, H-C₈); **7,21** (dd,1H, J=8,9 Hz, J= 2,5 Hz, H-C₆); **5,70**(d,1H, J= 0,5 Hz CH(OCH₃)₂); **3,94**(s,3H,C₇-OCH₃); **3,43** (s, 6H, (OCH₃)₂).

-R.M.N ¹³C (100 MHz; CDCl₃) δ ppm : **161,89**(Cquat, C₇); **149,65** (Cquat, C₂) ; **149,36**(Cquat, C_{8a}); **136,88**(H-C₄); **129,04** (H-C₈); **126,80** (Cquat, C₃); **121,19**(Cquat, C_{4a}); **120,46** (H-C₆); **106,37** (H-C₅); **100,53** (CH (OCH₃)₂); **55,64**(C₇-OCH₃); **53,85**(CH (OCH₃)₂).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour C₁₃H₁₄ N O₃ Cl

[M⁺] : 267,0662 ; trouvée : 267,0656

2-5: 2-chloro-3-diméthoxy-6-méthoxy-quinoléine

2-5

A partir de 0,5 g de 2-chloro-3-formyl-8-méthoxy-quinoléine et 0,8 ml de l'ortho formiate de méthyle en solution dans 6 ml de méthanol, on obtient 0,4 g de l'acétal **2-5**.

-Cristaux beige.

- Rdt = 74%

-CCM: Rf = 0,28 (acétate / éther 1/9)

- Tfus = 86°C

IR (KBr; ν cm⁻¹) = 2882-2926 (CH).

-R.M.N ¹H (400 MHz; CDCl₃) δ ppm : **8,31** (dd, 1H, J=1,0 Hz, J= 0,4 Hz, H-C₄); **7,91** (ddd, 1H, J=9,2 Hz, J=0,6 Hz, J=0,6 Hz, H-C₈); **7,39** (dd, 1H, J=9,2 Hz, J=2,8 Hz, H-C₇); **7,11** (d, 1H, J=2,8 Hz, H-C₅); **5,70**(d, 1H, J= 0,6 Hz CH(OCH₃)₂); **3,93**(s, 3H, C₇-OCH₃); **3,44** (s, 6H, (OCH₃)₂).

-R.M.N ¹³C (100 MHz; CDCl₃) δ ppm : **158,27**(Cquat, C₆); **143,73** (Cquat, C₂) ; **143,51**(Cquat, C_{8a}); **138,67** (Cquat, C₃); **136,02**(H-C₄); **129,63** (H-C₈); **126,61**(Cquat, C_{4a}); **123,50** (H-C₇); **105,50** (H-C₅); **100,52** (CH (OCH₃)₂); **55,61**(C₆-OCH₃); **53,91**(CH (OCH₃)₂).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour C₁₃H₁₄ N O₃ Cl

[M⁺] :267,0662 ; trouvée : 267,0656

b) La substitution nucléophile

Mode opératoire général

Dans un bicol de 100 ml sec, équipé d'un Barreau magnétique et d'un réfrigérant relié à une valve à huile et d'un septum, on introduit sous argon 500 mg (0,00183 mole) soit 8 eq de l'hydrure de sodium NaH en suspension dans de l'huile minérale (60%). on introduit quelques ml d'éther de pétrole anhydre de manière à couvrir la totalité de la suspension, puis on agite pendant 2 à 3 min pour dissoudre l'huile minérale dans l'éther de pétrole et on aspire le liquide avec une pipete Pasteur munie d'un bout de coton de manière à empêcher l'aspiration de la poudre de l'hydrure de sodium. On refait la même opération 2 fois de manière à s'assurer de la dissolution totale de cette huile. Puis on laisse sécher sous courant d'argon, jusqu'à l'obtention d'une poudre fine grise, et on introduit 3 ml de DMF distillé et conservé sur tamis moléculaire. Le montage réactionnel est plongé dans un bain de glace, et on additionne goutte à goutte 200 μ l (1,2 eq) de l'alcool allylique. Lorsque l'addition est terminée, le mélange réactionnel est abandonné pendant 10 min sous agitation à 0°C. Après cela, on ajoute 500 mg (1,4 mmole) de quinoléine acétal en solution dans 2 ml DMF goutte à goutte. Puis la réaction est abandonnée pendant une nuit dans les mêmes conditions. On épuise avec une solution de carbonate de sodium Na₂CO₃ (1/3 N), et on ajoute l'acétate d'éthyle, puis on lave à l'eau distillée. Les phases organiques réunies sont séchées sur Na₂SO₄, après filtration et distillation du solvant sous vide. Le produit brut obtenu est purifié par colonne de chromatographie sur gel de silice, en utilisant comme éluant l'acétate d'éthyle éther de pétrole avec les proportions 10/90.

3-1 : 2-allyloxy-3-diméthoxyméthyl-quinoléine

3-1

A partir de 500 mg (0,00182mmole) du produit **2-1**, et de 200 μ l (1.4eq) d'alcool allylique en solution dans 2 ml de DMF. Après purification on obtient 460 mg du produit **3-1**.

-huile jaune clair.

- **Rdt** = 85,18%

-**CCM** : Rf = 0,33 (acétate / éther 1/9)

- **IR** (CCl_4 ; $\nu \text{ cm}^{-1}$) = 2845-2874 (CH); 1597 (C=C).

-**R.M.N** ^1H (400 MHz; CDCl_3) δ ppm : 8,25(dd, 1H, J= 0,9 Hz, $\underline{\text{H-C}}_4$); 7,82(ddd, 1H, J= 8,4 Hz, J= 1,2 Hz, J= 0,6 Hz, $\underline{\text{H-C}}_8$); 7,75(ddd, 1H, J= 8,0 Hz, J= 1,5 Hz, J= 0,5 Hz, $\underline{\text{H-C}}_5$); 7,61(ddd, 1H, J= 8,4 Hz, J=6,9 Hz, J= 1,5 Hz, $\underline{\text{H-C}}_7$); 7,37(ddd, 1H, J= 8,0 Hz, J=6,9 Hz, J= 1,2 Hz, $\underline{\text{H-C}}_6$); 6,16(ddt, 1H, J=17,2 Hz, J= 10,5 Hz, J= 5,3 Hz, $\underline{\text{HC=CH}}_2$); 5,70(d, 1H, J= 0,7 Hz, $\underline{\text{H-C}}(\text{OMe})_2$); 5,46(ddt, 1H, J= 17,2 Hz, J=1,7 Hz, J=1,7 Hz, $\underline{\text{H}}$ trans); 5,26(ddt, 1H, J= 10,5 Hz, J=1,5 Hz, J=1,5 Hz, $\underline{\text{H}}$ cis); 5,07(dt, 2H, J= 5,3 Hz, J= 1,5 Hz, $\underline{\text{OCH}}_2$); 3,42(s, 6H, $\text{CH}(\underline{\text{OCH}}_3)_2$).

-**R.M.N** ^{13}C (100 MHz; CDCl_3) δ ppm : 159,00(Cquat, $\underline{\text{C}}_2$); 146,31(Cquat, $\underline{\text{C}}_{8a}$); 136,34($\underline{\text{H-C}}_4$); 133,54 ($\underline{\text{H-C}}=$); 129,73 ($\underline{\text{H-C}}_7$); 127,96($\underline{\text{H-C}}_8$); 126,90 ($\underline{\text{H-C}}_6$); 124,77 (Cquat, $\underline{\text{C}}_{4a}$); 124,19 ($\underline{\text{H-C}}_5$); 121,83(Cquat, $\underline{\text{C}}_3$); 117,18(= $\underline{\text{CH}}_2$); 98,95 ($\underline{\text{CH}}$ (OCH_3) $_2$); 66,58 ($\underline{\text{OCH}}_2$); 53,74($\underline{\text{CH}}$ (OCH_3) $_2$)

-**Spectrométrie de masse**: Masse calculée pour $\text{C}_{15}\text{H}_{17}\text{N O}_3 \text{Na}$

$[\text{M}^+ \text{Na}]^+$: 282,1106 ; trouvée : 282,1106

3-2: 2-allyloxy-3-diméthoxyméthyl-6-méthyl-quinoléine

3-2

A partir de 1,14 g (0,0045mmole) du produit 2-2, et de 550 μl (1.4 eq) d'alcool allylique en solution dans 4 ml de DMF. Après purification on obtient 1,09 g du produit 3-2.

-huile jaune clair.

- **Rdt** = 88,11%

-**CCM** : Rf = 0,5 (acétate / éther 1/9)

-**IR** (CCl₄; ν cm⁻¹) = 2893-2917 (CH); 1587 (C=C).

-**R.M.N** ¹H(400 MHz; CDCl₃) δ ppm : 8,14(t large, 1H, J= 1,0 Hz, H-C₄); 7,71(d, 1H, J= 8,5 Hz, H-C₈); 7,53-7,50(m, 1H, H-C₅); 7,44(ddd, 1H, J= 8,5 Hz, J= 1,5 Hz, J= 0,6 Hz, H-C₇); 6,16(ddt, 1H, J=17,2 Hz, J= 10,5 Hz, J= 5,2 Hz, HC=CH₂); 5,69(d, 1H, J= 0,7 Hz H-C(OMe)₂); 5,45(ddt, 1H, J= 17,2 Hz, J=1,6 Hz, J=1,6 Hz, H trans); 5,25(ddt, 1H, J = 10,5 Hz, J=1,5 Hz, J=1,5 Hz, H cis); 5,05(dt, 2H, J= 5,3 Hz, J= 1,5 Hz, OCH₂); 3,42(s, 6H, CH(OCH₃)₂); 2,47(s, 3H, C₆-CH₃).

-**R.M.N** ¹³C (100 MHz; CDCl₃) δ ppm : 158,64(Cquat, C₂); 144,62(Cquat, C_{8a}); 135,80(H-C₄); 133,76(Cquat, C₆); 133,65(H-C=CH₂); 131,78 (H-C₇); 127,06(H-C₅); 126,61 (H-C₈); 124,73 (Cquat, C_{4a}); 121,17(Cquat, C₃); 117,06(=CH₂); 99,04 (CH (OCH₃)₂); 66,48 (OCH₂); 53,74(CH (OCH₃)₂); 21,30(C₆-CH₃).

-**Spectrométrie de masse**: Masse calculée pour C₁₆H₁₉NO₃

[M⁺] : 273,1364 ; trouvée : 273,1352

3-3 : 2-allyloxy-3-diméthoxyméthyl-8-méthyl-quinoléine

3-3

A partir de 500 mg (0,0024mmole) du produit 2-3, et de 200 μ l (1.4 eq) d'alcool allylique en solution dans 3 ml de DMF. Après purification on obtient 390 mg du produit 3-3.

- huile jaune clair.

-**Rdt** = 73,44%

-**CCM**: Rf = 0,41 (acétate / éther 1/9)

-IR (CCl₄; ν cm⁻¹) = 2882-2908(CH); 1601 (C=C).

-R.M.N ¹H(400 MHz;CDCl₃)δppm : 8,46(s, 1H, H-C₄) ; 7,61(dd ;1H , J= 7,8 Hz, J= 2,1 Hz, H-C₅) ; 7,49 (ddq, 1H, J= 7,4 Hz, J= 1,4 Hz, J= 0,8 Hz, H-C₇) ;7,21 (dd,1H, J= 7,8 Hz, J= 7,4 Hz,H-C₆) ; 6,18 (ddt, 1H, J=17,2 Hz, J= 10,5 Hz, J= 5,2 Hz, HC=CH₂) ; 5,70 (d, 1H, J= 0,6 Hz H-C(OMe)₂) ; 5,44 (ddt, 1H, J= 17,2 Hz, J=1,6 Hz, J=1,6 Hz, H trans) ; 5,23 (ddt, 1H, J = 10,5 Hz, J=1,5 Hz, J=1,5 Hz, Hcis) ; 5,00 (dt,2H, J= 5,3 Hz ,J= 1,5 Hz, OCH₂) ; 3,42 (s,6H , CH(OCH₃)₂) ;2,39 (s,3H, C₈-CH₃).

-R.M.N ¹³C (100 MHz ; CDCl₃) δ ppm : 148,00(Cquat, C₂) ; 147,80(Cquat, C_{8a}); 140,00(H-C₄); 137,00(Cquat,C₈) ; 133,66 (H-C₇); 133,40(H-C=CH₂); 127,83(H-C₆); 127,56 (H-C₅); 126,00 (Cquat,C₃ ou C_{4a});125,95(Cquat, C₃ ou C_{4a});117,00(= C₂) ; 100,00 (CH (OCH₃)₂); 66,00 (OCH₂) ; 54,21(CH (OCH₃)₂) ;16,58(C₈-CH₃).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour C₁₆H₁₉ N O₃ Na
[M⁺ Na]⁺: 296, 1262; trouvée: 296, 1263

3-4: 2-allyloxy-3-diméthoxyméthyl-7-méthoxy-quinoléine

3-4

A partir de 500 mg (0,0018mmole) du produit **2-4**, et de 250 ul (1.4 eq) d'alcool allylique en solution dans 4 ml de DMF. Après purification on obtient 400 mg du produit **3-4**.

-huile jaune clair.

-Rdt = 74,07 %

-CCM : Rf = 0,56 (acétate / éther 1/9)

-IR (CCl₄; ν cm⁻¹) = 2867-2925 (CH); 1518 (C=C).

-R.M.N ^1H (400 MHz;CDCl₃) δ ppm : **8,25**(s large, $\underline{\text{H-C}}_4$); **7,72**(d , 1H, J= 8,9 Hz, $\underline{\text{H-C}}_5$); **7,24**(d ,1H , J= 2,5 Hz, $\underline{\text{H-C}}_8$); **7,18**(dd, 1H, J= 8,9 Hz, J= 2,5 Hz, $\underline{\text{H-C}}_6$); **6,18**(ddt, 1H, J=17,2 Hz, J= 10,5 Hz, J= 5,5 Hz, $\underline{\text{CH=CH}}_2$); **5,69**(d, 1H, J= 0,5 Hz $\underline{\text{H-C}}(\text{OMe})_2$); **5,50**(ddt, 1H, J= 17,2 Hz, J=1,6 Hz, J=1,6 Hz, $\underline{\text{H}}$ trans); **5,31**(ddt, 1H, J = 10,5 Hz, J=1,3 Hz, J=1,3 Hz, $\underline{\text{H}}$ cis); **5,07**(ddt, 2H, J= 5,3 Hz, J= 1,6 Hz, J= 1.3 Hz, $\underline{\text{OCH}}_2$); **3,93**(s, 3H, $\underline{\text{C}}_7\text{-OCH}_3$); **3,42**(s, 6H , $\underline{\text{CH}}(\text{OCH}_3)_2$).

-R.M.N ^{13}C (100 MHz; CDCl₃) δ ppm : **160,47**(Cquat, $\underline{\text{C}}_7$); **149,21**(Cquat, $\underline{\text{C}}_2$); **147,63**(Cquat, $\underline{\text{C}}_{8a}$); **135,45**($\underline{\text{H-C}}_4$); **132,77** ($\underline{\text{H-C=}}$); **129,79** ($\underline{\text{H-C}}_8$); **124,80**(Cquat, $\underline{\text{C}}_3$); **121,40** (Cquat, $\underline{\text{C}}_{4a}$); **117,93**(= $\underline{\text{CH}}_2$); **117,86**($\underline{\text{H-C}}_6$); **106,38**($\underline{\text{H-C}}_5$); **100,47** ($\underline{\text{CH}}$ (OCH₃)₂); **66,88** (OCH₂); **55,68**($\underline{\text{C}}_7\text{-OCH}_3$); **53,90**($\underline{\text{CH}}$ (OCH₃)₂)

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour C₁₆H₁₉ N O₄

[M⁺] : 289,1314 ; trouvée : 289,1312

3-5: 2-allyloxy-3-diméthoxyméthyl-6-méthoxy-quinoléine

3-5

A partir de 400 mg (0,0014mmole) du produit **2-5**, et de 200 ul (1.4 eq) d'alcool allylique en solution dans 3 ml de DMF. Après purification on obtient 300 mg du produit **3-5**.

-huile jaune clair.

-Rdt = 79,16%

-CCM : Rf = 0,56 (acétate / éther 1/9).

-IR (CCl₄; ν cm⁻¹) = 2852-2914 (CH); 1522 (C=C).

-R.M.N ^1H (400 MHz;CDCl₃) δ ppm : **8,14**(d large,1H, J= 0,3 Hz, $\underline{\text{H-C}}_4$); **7,72**(ddd , 1H, J= 9,1 Hz, J= 0,5 Hz, J= 0,5 Hz, $\underline{\text{H-C}}_8$); **7,27**(dd ,1H , J= 9,1 Hz, J= 2,8 Hz, $\underline{\text{H-C}}_7$); **7,08**(d, 1H, J= 2,8 Hz, $\underline{\text{H-C}}_5$); **6,16**(ddt, 1H, J=17,2 Hz, J= 10,5 Hz, J= 5,3 Hz,

$\underline{\text{CH}}=\underline{\text{CH}}_2$) ; **5,69**(d, 1H, $J = 0,5 \text{ Hz}$ $\underline{\text{H}}-\text{C}(\text{OMe})_2$) ; **5,45**(ddt, 1H, $J = 17,2 \text{ Hz}$, $J = 1,6 \text{ Hz}$, $J = 1,6 \text{ Hz}$, $\underline{\text{H}}$ trans) ; **5,25**(ddt, 1H, $J = 10,5 \text{ Hz}$, $J = 1,5 \text{ Hz}$, $J = 1,5 \text{ Hz}$, $\underline{\text{H}}$ cis) ; **5,04**(dt, 2H, $J = 5,3 \text{ Hz}$, $J = 1,5 \text{ Hz}$, OCH_2) ; **3,89**(s, 3H, C_6-OCH_3) ; **3,42**(s, 6H, $\text{CH}(\text{OCH}_3)_2$).

-R.M.N ^{13}C (100 MHz, CDCl_3) δ ppm : **157,77**(Cquat, $\underline{\text{C}}_6$) ; **156,17**(Cquat, $\underline{\text{C}}_2$) ; **141,74**(Cquat, $\underline{\text{C}}_{8a}$) ; **135,40**($\text{H}-\underline{\text{C}}_4$) ; **133,69** ($\text{H}-\underline{\text{C}}=$) ; **128,21** ($\text{H}-\underline{\text{C}}_8$) ; **125,32**(Cquat, $\underline{\text{C}}_3$) ; **121,95** (Cquat, $\underline{\text{C}}_{4a}$) ; **121,44**($\text{H}-\underline{\text{C}}_7$) ; **117,03**($=\underline{\text{C}}_2$) ; **106,53**($\text{H}-\underline{\text{C}}_5$) ; **99,03** ($\underline{\text{C}}\text{H} (\text{OCH}_3)_2$) ; **66,44** (OCH_2) ; **55,51**(C_6-OCH_3) ; **53,78**($\text{CH} (\text{OCH}_3)_2$)

Spectrométrie de masse: Masse calculée pour $\text{C}_{16}\text{H}_{19}\text{N O}_4$

$[\text{M}^+]$: 289,1314 ; trouvée : 289,1312

c) Déprotection de l'acétal (obtention de l'aldéhyde)

-Mode opératoire

Dans un ballon de 100 ml équipé d'un Barreau magnétique et d'un réfrigérant ascendant, on introduit 1g (0,0036mole) de 2-allyloxy-3-diméthyl-quinoline en solution dans 2,65 ml de THF et 9,25 ml d'eau distillée, puis on ajoute 62 mg (0,0036 mole , 0,1eq) de APTH. Le mélange réactionnel est chauffé à 70°C pendant 3 heures. Après refroidissement, on épuise à l'acétate d'éthyle et on lave à l'eau distillée 2 fois. Les phases organiques réunies sont séchées sur sulfate de sodium, après filtration et distillation du solvant, le produit brut obtenu est purifié par chromatographie sur gel de silice en utilisant comme éluant l'acétate d'éthyle et l'éther de pétrole (10 /90).

4-1 : 2-allyloxy-3-formylquinoléine

4-1

A partir de 850 mg (0,033 mmole) du produit **3-1** et de 52 mg soit 0,1 eq d'acide *para*-toluènesulfonique en solution dans 2,4 ml de THF et 7,6ml d'eau distillée. Après purification, on obtient 500 mg de l'aldéhyde **4-1** attendu.

-Cristaux blanc

-Rdt = 69 %.

-CCM: Rf = 0,48 (acétate / éther : 2/8)

-Tfus= 68°C

-IR (KBr;v cm⁻¹) = 2932(CH) ; 1696 (C=O); 1607 (C=C) .

-R.M.N ¹H(400 MHz;CDCl₃)δppm : 10,52(s,1H,CHO); 8,61(s large,1H, H-C₄); 7,87-7,83(m, 2H, H-C₈, et H-C₅); 7,73(ddd, 1H, J= 8,5 Hz , J=6,9 Hz, J= 1,4 Hz, H-C₇) ; 7,43(ddd, 1H, J= 8,0 Hz, J= 6,9 Hz, J= 1,2 Hz, H-C₆) ; 6,20(ddt, 1H, J= 17,2 Hz, J= 10,5 Hz, J= 5,5 Hz, HC=CH₂) ; 5,49(ddt,1H, J= 17,2 Hz, J=1,6 Hz, J=1,6 Hz, H trans) ; 5,33(ddt, 1H ,J = 10,5 Hz, J= 1,6 Hz, J=1,4 Hz, Hcis) ; 5,13(dt, 2H, J= 5,5, J=1,4 Hz, OCH₂).

-R.M.N ¹³C (100 MHz; CDCl₃)δ ppm : 189,27(CHO) ; 160,53(Cquat, C₂) ; 148,91(Cquat, C_{8a}); 139,92(H-C₄); 132,93 (H-C=CH₂); 132,58 (H-C₇); 129,76(H-C₈); 127,30 (H-C₅); 125,09 (H-C₆); 124,43 (Cquat,C_{4a}); 119,99 (Cquat, C₃); 118,07 (H-C=CH₂) ; 67,08 (OCH₂).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour C₁₃H₁₁ N O₂

[M⁺] : 213,0789 ; trouvée : 213,0770

4-2: 2-allyloxy-6-méthyl-3-formylquinoléine

4-2

A partir de 1 g (0,036 mmole) du produit **3-2** et de 62 mg soit 0,1 eq d'acide *para*-toluènesulfonique en solution dans 2,6 ml de THF et 9 ml d'eau distillée. Après purification, on obtient 710 mg de l'aldéhyde **4-2** attendu.

-cristaux vert clair

- Rdt = 79,77 %.

-CCM: Rf = 0,51 (acétate / éther : 2/8)

-Tfus = 89°C

-IR (KBr; ν cm⁻¹) = 2864-2926 (CH) ; 1694 (C=O); 1565 (C=C) .

-R.M.N ¹H(400 MHz;CDCl₃) δ ppm : 10,51(s, 1H,CHO); 8,52(s large, 1H, H-C₄); 7,74(d, 1H, J= 8,5 Hz, H-C₈) ; 7,60-7,61(m, 1H, H-C₅) ; 7,56 (dd, 1H ,J = 8,5 Hz, J= 2,0 Hz, H-C₇); 6,19(ddt, 1H, J= 17,2 Hz, J= 10,5 Hz, J= 5,5 Hz, HC=CH₂) ; 5,49(ddt,1H, J= 17,2 Hz, J=1,5 Hz, J=1,5 Hz, H trans) ; 5,32(ddt, 1H ,J = 10,5 Hz, J= 1,4 Hz, J=1,4 Hz, Hcis) ; 5,11(dt, 2H, J= 5,5, J=1,4 Hz, OCH₂); 2,50(s,3H,C₆-CH₃).

-R.M.N ¹³C (100 MHz; CDCl₃) δ ppm : 189,40(CHO) ; 160,18(Cquat, C₂) ; 147,32(Cquat, C_{8a}); 139,29(H-C₄); 134,85(Cquat,C₆); 134,80 (H-C=CH₂); 133,05 (H-C₇); 128,62(H-C₅); 126,99 (H-C₈); 124,41(Cquat,C_{4a}); 120,00(Cquat, C₃);117,93(H-C= CH₂) ; 66,98 (OCH₂);21,24(C₆-CH₃).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour C₁₄H₁₃ N O₂

[M⁺] :227,0946 ; trouvée : 227,0955

4-3: 2-allyloxy-8-méthyl-3-formylquinoléine

4-3

A partir de 400 mg (0,090 mmole) du produit **3-3** et de 25 mg soit 0,1 eq d'acide *para*-toluènesulfonique en solution dans 1 ml de THF et 3,6 ml d'eau distillée. Après purification, on obtient 340 mg de l'aldéhyde **4-3** attendu.

- cristaux blancs

- Rdt = 75,22 %.

-CCM: Rf = 0,6 (acétate/éther : 2/8)

-Tfus = 86°C

-IR (KBr;v cm⁻¹) = 2866-2904 (CH) ; 1688 (C=O); 1592 (C=C) .

-R.M.N ¹H(400 MHz;CDCl₃)δppm : 10,52(s,1H,CHO); 8,80(s large,1H, H-C₄); 7,56(dd large, 1H, J= 7,7 Hz, J= 0,5 Hz, H-C₅) ; 7,33 (dtd, 1H ,J = 7,4 Hz, J= 0,9 Hz, J= 0,5 Hz, H-C₇);7,11(dd, 1H, J= 7,7 Hz, J= 7,4 Hz, H-C₆); 6,20(ddt, 1H, J= 17,0 Hz, J= 10,5 Hz, J= 5,5 Hz, HC=CH₂) ; 5,50(ddt,1H, J= 17,0 Hz, J=1,6 Hz, J=1,6 Hz, H trans) ; 5,33(ddt, 1H ,J = 10,5 Hz, J= 1,6 Hz, J=1,6 Hz, Hcis) ; 5,10(ddd, 2H, J= 5,6Hz, J=1,6 Hz, J=1,3 Hz, OCH₂); 2,78(s, 3H, C₈-CH₃).

-R.M.N ¹³C (100 MHz ; CDCl₃) δ ppm : 189,00(CHO) ; 161,00(Cquat, C₂) ; 148,00(Cquat, C_{8a}); 136,52(Cquat,C₈); 134,80(H-C₄); 130,57 (H-C₇); 130,00 (H-C=CH₂); 125,49(H-C₅); 124,00(Cquat,C_{4a} ou C₃); 123,00(Cquat, C₃ ou C_{4a}); 121,42 (H-C₆); 118,05(H-C=CH₂) ; 66,01 (OCH₂);18,00(C₈-CH₃).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour C₁₄H₁₃ N O₂

[M⁺] : 227,0946 ; trouvée : 227,0955

4-4: 2-allyloxy-7-méthoxy-3-formylquinoléine

4-4

A partir de 540 mg (0,018 mmole) du produit **3-4** et de 34 mg soit 0,1 eq d'acide *para*-toluènesulfonique en solution dans 1,5 ml de THF et 5 ml d'eau distillée. Après purification, on obtient 360 mg de l'aldéhyde **4-4** attendu.

- cristaux blancs

-Rdt = 74 %.

-CCM: Rf = 0,52 (acétate / éther : 2/8)

- Tfus = 94°C

-IR (KBr;v cm⁻¹) = 2984 (CH) ; 1689 (C=O); 1524 (C=C) .

-R.M.N ^1H (400 MHz; CDCl_3) δ ppm : 10,47(s,1H,CHO); 8,61(dd large, 1H, $J= 0,5 \text{ Hz}$, H-C_4); 7,72(d, 1H, $J= 8,9 \text{ Hz}$, H-C_5); 7,20 (d large, 1H, , $J= 2,5 \text{ Hz}$, H-C_8); 7,06(dd, 1H, $J= 8,9 \text{ Hz}$, $J=2,5 \text{ Hz}$, H-C_6); 6,20(ddt, 1H, $J= 17,2 \text{ Hz}$, $J= 10,5 \text{ Hz}$, $J= 5,5 \text{ Hz}$, $\text{H-C}=\text{CH}_2$) ; 5,49(ddt,1H, $J= 17,2 \text{ Hz}$, $J=1,6 \text{ Hz}$, $J=1,6 \text{ Hz}$, H trans) ; 5,33(ddt, 1H , $J = 10,5 \text{ Hz}$, $J= 1,6 \text{ Hz}$, $J=1,3 \text{ Hz}$, H cis) ; 5,11(ddd, 2H, $J= 5,5$, $J=1,6 \text{ Hz}$, $J=1,4 \text{ Hz}$,OCH₂); 3,97(s, 3H, OCH₃).

-R.M.N ^{13}C (100 MHz ; CDCl_3) δ ppm : 189,05(CHO) ;163,60(Cquat, C₇); 161,35(Cquat, C₂) ; 151,31(Cquat, C_{8a}); 139,34(H-C₄); 132,99 (H-C=CH₂); 130,94 (H-C₈); 119,35(Cquat, C₃); 117,93(H-C= CH₂); 117,89 (H-C₆); 117,70(Cquat,C_{4a});106,27(H-C₅); 67,00 (OCH₂) ; 55,68(C₇,OCH₃).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour C₁₄H₁₃ N O₃

[M⁺] :243,0895 ; trouvée : 243,08954

4-5: 2-allyloxy-6-méthoxy-3-formylquinoléine

4-5

A partir de 650 mg (0,021 mmole) du produit 3-5 et de 39 mg soit 0,1 eq d'acide *para*-toluènesulfonique en solution dans 1,7 ml de THF et 6 ml d'eau distillée. Après purification, on obtient 450 mg de l'aldéhyde 4-5 attendu.

- cristaux vert clair

-Rdt = 86%.

-CCM: Rf = 0,52 (acétate / éther : 2/8)

-Tfus = 78°C

-IR (KBr; $\nu \text{ cm}^{-1}$) = 2895 (CH) ; 1688 (C=O); 1607 (C=C) .

-R.M.N ^1H (400 MHz; CDCl_3) δ ppm : 10,47(s,1H,CHO); 8,22(d large,1H, $J= 0,3 \text{ Hz}$, H-C_4); 7,67(dd , 1H, $J= 9,1 \text{ Hz}$, $J= 0,5 \text{ Hz}$, H-C_8); 7,28(dd ,1H , $J= 9,1 \text{ Hz}$, $J= 2,8 \text{ Hz}$, H-C_7) ; 7,06(d, 1H, $J= 2,8 \text{ Hz}$, H-C_5) ; 6,20(ddt, 1H, $J=17,2 \text{ Hz}$, $J= 10,5 \text{ Hz}$, $J= 5,3 \text{ Hz}$,

$\underline{\text{H}}\text{C}=\underline{\text{C}}\text{H}_2$) ; **5,49**(ddt, 1H, J= 17,2 Hz, J= 1,6 Hz, J=1,6 Hz, $\underline{\text{H}}$ trans) ; **5,33**(ddt, 1H, J = 10,5 Hz, J= 1,3 Hz, J=1,3 Hz, $\underline{\text{H}}\text{cis}$) ; **5,10**(ddd, 2H, J=5,5 Hz, J=1,6 Hz, J=1,3 Hz, OCH_2); **3,98**(s, 3H, $\text{C}_6\text{-OCH}_3$).

-R.M.N ^{13}C (100 MHz, CDCl_3) δ ppm : **190,05** ($\underline{\text{C}}\text{HO}$); **163,87**(C_{quat} , $\underline{\text{C}}_2$); **160,35**(C_{quat} , $\underline{\text{C}}_6$) ; **145,71**(C_{quat} , $\underline{\text{C}}_{8a}$); **138,69** ($\text{H}-\underline{\text{C}}_4$); **133,27** ($\text{H}-\underline{\text{C}}=\text{CH}_2$) ; **131,94** ($\text{H}-\underline{\text{C}}_8$); **122,21**(C_{quat} , $\underline{\text{C}}_{4a}$ ou $\underline{\text{C}}_3$); **122,58**(C_{quat} , $\underline{\text{C}}_3$ ou $\underline{\text{C}}_{4a}$); **120,44**($\text{H}-\underline{\text{C}}_7$); **117,84**($\text{H}-\text{C}=\underline{\text{C}}\text{H}_2$) ; **106,09**($\text{H}-\underline{\text{C}}_5$); **67,07**(OCH_2); **55,36** ($\text{C}_6\text{-OCH}_3$).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour $\text{C}_{14}\text{H}_{13}\text{N O}_3$

$[\text{M}^+]$: 243,0895 ; trouvée : 243,08954

d) l'alkylation

Mode opératoire:

Dans un bicol de 100 ml équipé d'un barreau magnétique et d'un réfrigérant ascendant, relié à une valve à huile, on introduit sous courant d'argon 500 mg (0.0023mmole) de 2-allyloxy-3-formyl-quinoléine en solution, dans 25 ml de THF anhydre. La solution est refroidie à 0 °C, puis on lui additionne 6,5 ml soit 1,2 eq d'une solution (2 M) de CH_3MgI dans l'éther anhydre, goutte à goutte sous agitation magnétique et sous courant d'argon ; une fois l'addition terminée, le milieu réactionnel est abandonné pendant 1 heure sous agitation à 0°C puis pendant 1 heure à température ambiante. Le mélange réactionnel est épuisé avec 4 ml d'HCl (1,3 N), ensuite il est repris avec 30 ml d'acétate d'éthyle, puis lavé 2 fois à l'eau distillée. Les phases organiques réunies sont séchées sur sulfate de sodium. Après filtration et distillation du solvant, le produit brut est purifié par chromatographie sur colonne de gel de silice en utilisant comme éluant l'acétate d'éthyle, l'éther de pétrole (20 / 80).

5-1: 1-(2-allyloxy-quinoléin-3-yl)-éthanol

5-1

A partir de 600 mg (0,0026mole) d'aldéhyde **4-1** en solution, dans 30 ml de THF et 7,8 ml (1,2 eq) CH₃MgI, on obtient après purification 540 mg du produit **5-1**.

- cristaux blancs.

- **Rdt** = 90,69%

-**CCM** : Rf = 0,33 (acétate / éther 2/8).

-**Tfus**= 74°C

IR (KBr; ν cm⁻¹) = 3241 (OH); 2939 (CH); 1639 (C=C).

-R.M.N ¹H (400 MHz; CDCl₃) δ ppm : **8,03**(t, 1H, J= 0,9 Hz, H-C₄); **7,82**(ddd , 1H, J= 8,4 Hz, J= 1,1 Hz, J= 0,6 Hz, H-C₈) ; **7,73**(dd ; 1H , J= 8,0 Hz, J= 1,5 Hz, H-C₅) ; **7,60**(ddd, 1H, J= 8,4 Hz, J= 7,0 Hz, J=1,5 Hz, H-C₇) ; **7,38**(ddd, 1H, J= 8,0 Hz, J= 7,0 Hz, J= 1,2 Hz, H-C₆) ; **6,17**(ddt, 1H, J=17,2 Hz, J= 10,5 Hz, J= 5,5 Hz, HC=CH₂) ; **5,45**(ddt, 1H, J= 17,2 Hz, J= 1,6 Hz, J=1,6 Hz, H trans) ; **5,29**(ddt, 1H , J = 10,5 Hz, J= 1,4 Hz, J=1,4 Hz, Hcis) ; **5,16**(qlarge, 1H, J=6,5, H-C(CH₃)OH); **5,07**(ddd, 2H, J=5,5 Hz, J=1,5 Hz, J=1,5 Hz, OCH₂); **2,62**(slarge, 1H, OH); **1,60**(d, 3H, J= 6,5 Hz, HC(OH)-CH₃).

-R.M.N ¹³C (100 MHz; CDCl₃) δ ppm : **158,89**(Cquat, C₂) ; **145,48**(Cquat, C_{8a}); **133,93**(H-C₄); **133,31** (H-C=CH₂); **129,20** (H-C₇); **127,49**(H-C₅); **126,83** (H-C₈); **125,34**(Cquat,C_{4a},C₃);**124,31**(H-C₆);**117,69**(HC=CH₂) ;**66,71**(OCH₂);**66,07**(HC(CH₃)OH); **22,60**(HC(CH₃)).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour C₁₄H₁₅ N O₂

[M⁺] :229,1102 ; trouvée : 229,1092

5-2: 1-(2-allyloxy-6-méthyl-quinoléin-3-yl)-éthanol

A partir de 400 mg (0,001mole) d'aldéhyde **4-2** en solution, dans 20 ml de THF et 5,2 ml (1,2 eq) CH₃MgI, on obtient après purification 350 mg du produit **5-2**.

- cristaux jaune clair.

-Rdt = 85,46%

-CCM: Rf = 0,34 (acétate/éther 2/8)

-Tfus = 76°C

-IR (KBr; ν cm⁻¹) = 3278 (OH); 2925 (CH); 1621 (C=C).

-R.M.N ¹H (400 MHz; CDCl₃) δ ppm : 7,94(s, 1H, H-C₄); 7,72(d, 1H, J= 8,5 Hz, H-C₈); 7,49-7,50(m, 1H, H-C₅); 7,43(dd, 1H, J= 8,4 Hz, J=1,9 Hz, H-C₇); 6,16(ddt, 1H, J=17,2 Hz, J= 10,5 Hz, J= 5,5 Hz, HC=CH₂); 5,44(ddt, 1H, J= 17,2 Hz, J= 1,6 Hz, J=1,6 Hz, H trans); 5,29(ddt, 1H, J= 10,5 Hz, J= 1,3 Hz, J=1,3 Hz, H cis); 5,14(qd, 1H, J= 6,5 Hz, J=0,7, H-C(CH₃)OH); 5,06(ddd, 2H, J=5,5 Hz, J=1,4 Hz, J=1,4 Hz, OCH₂); 2,42(s, 3H, C₆-CH₃); 1,52(d, 3H, J= 6,5 Hz, HC(OH)-CH₃).

-R.M.N ¹³C (100 MHz; CDCl₃) δ ppm : 158,45 (Cquat, C₂); 143,68 (Cquat, C_{8a}); 133,52(H-C₄); 131,36(Cquat, C₆); 131,27 (H-C=CH₂); 131,27 (H-C₇); 129,03(H-C₅); 126,64 (H-C₈); 126,47 (Cquat, C₃); 125,27 (Cquat, C_{4a}); 117,62 (HC=CH₂); 66,70 (OCH₂); 66,14 (HC(CH₃)OH); 22,62(HC(CH₃)OH); 21,33 (C₆-CH₃).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour C₁₅H₁₇NO₂

[M⁺]: 243,1259 ; trouvée : 243,1265

5-3: 1-(2-allyloxy-8-méthyl-quinoléin-3-yl)-éthanol

A partir de 600 mg (0,0026mole) d'aldéhyde **4-3** en solution, dans 30 ml de THF et 7,8 ml (1,2 eq) CH₃MgI, on obtient après purification 540 mg du produit **5-3**.

- cristaux blancs.

-Rdt = 85,46%

-CCM: Rf = 0,28 (acétate / éther 2/8)

-Tfus = 78°C

-IR (KBr; ν cm⁻¹) = 3263 (OH); 2917 (CH); 1650 (C=C).

-R.M.N ¹H (400 MHz; CDCl₃) δ ppm : **7,69**(slarge,1H, H-C₄); **7,46**(dd ,1H , J= 8,0 Hz, J= 1,1 Hz, H-C₅) ; **7,35**(dd, 1H, J= 8,5 Hz, J= 2,0 Hz, H-C₇) ; **7,18**(m,1H, H-C₆); **6,19**(ddt, 1H, J=17,2 Hz, J= 10,5 Hz, J= 5,5 Hz, HC=CH₂) ; **5,49**(ddt,1H,J= 17,2 Hz ,J= 1,6 Hz, J=1,6 Hz, H trans) ; **5,27**(ddt, 1H ,J= 10,5 Hz, J= 1,5 Hz, J=1,5 Hz, Hcis) ; **5,16**(qlarge, 1H, J=6,5, H-C(CH₃)OH); **5,09**(ddd, 2H, J=5,5 Hz, J=1,6 Hz, J=1,5 Hz, OCH₂); **2,35**(s, 3H, C₈-CH₃); **1,49** (d, 3H, J= 6,5 Hz, HC(OH)-CH₃).

-R.M.N ¹³C (100 MHz; CDCl₃) δ ppm : **159,31**(Cquat, C₂) ; **146,00**(Cquat, C_{8a}); **137,49** (H-C=CH₂); **136,26** (H-C₄);**133,52**(Cquat,C₈); **129,11** (H-C₇); **124,90** (H-C₅); **124,53**(H-C₆);**123,44**(Cquat,C_{4a});**122,30**(Cquat,C₃);**115,11**(HC=CH₂);**66,64**(OCH₂);**62,22**(HC(CH₃)OH); **22,51**(HC(CH₃)OH); **17,31** (C₈-CH₃).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour C₁₅H₁₇ N O₂

[M⁺] :243,1259 ; trouvée : 243,1265

5-4: 1-(2-allyloxy-7-méthoxy-quinoléin-3-yl)-éthanol

5-4

A partir de 300 mg (0,0012mole) d'aldéhyde **4-4** en solution, dans 15 ml de THF et 4 ml (1,2 eq) CH₃MgI, on obtient après purification 260 mg du produit **5-4**.

- cristaux jaune clair.
- Rdt = 83,87%
- CCM: Rf = 0,34 (acétate / éther 2/8)
- Tfus = 76°C

IR (KBr; ν cm⁻¹) = 3271 (OH); 2985 (CH); 1621 (C=C).

-R.M.N ¹H (400 MHz; CDCl₃) δ ppm : 8,03(dd,1H, J= 1,0 Hz , J= 0,9 Hz , H-C₄); 7,61(d , 1H, J= 8,8 Hz, H-C₅) ;7,20(d ,1H , J= 2,5 Hz, H-C₈) ; 7 ,03(dd, 1H, J= 8,8 Hz, J= 2,5 Hz, H-C₆) ; 6,17(ddt, 1H, J=17,2 Hz, J= 10,5 Hz, J= 5,5 Hz, HC=CH₂) ; 5,45(ddt,1H,J= 17,2 Hz ,J= 1,6 Hz, J=1,6 Hz, H trans) ; 5,30(ddt, 1H ,J = 10,5 Hz, J= 1,3 Hz, J=1,3 Hz, Hcis) ; 5,14(qd, 1H, J=6,5, J= 0,6 Hz , H-C(CH₃)OH); 5,06(ddd, 2H, J=5,5 Hz, J=1,6 Hz, J=1,3 Hz, OCH₂); 3,93(s, 3H, C₇-OCH₃); 1,50(d, 3H, J= 6,5 Hz, HC(OH)-CH₃).

-R.M.N ¹³C (100 MHz; CDCl₃) δ ppm :160,79(Cquat, C₂); 159,44(Cquat, C₇); 147,00(Cquat,C_{4a}); 133,82 (H-C=CH₂) ; 133,33 (H-C₄); 128,50(H-C₅); 126,38(Cquat,C_{8a}); 120,02(Cquat,C₃);117,63(H-C=CH₂) ; 116,48(H-C₆); 106,13(H-C₅); 66,65(OCH₂) ; 66,00 (HC(CH₃)OH) ;55,47 (C₇-OCH₃); 22,59 (HC(CH₃)OH).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour C₁₅H₁₇ N O₃

[M⁺] :259,1208 ; trouvée : 259,1203

5-5: 1-(2-allyloxy-6-méthoxy-quinoléin-3-yl)-éthanol

5-5

A partir de 400 mg (0,0018mole) d'aldéhyde 4-5 en solution, dans 20 ml de THF et 5,5 ml (1,2 eq) CH₃MgI, on obtient après purification 264 mg du produit 5-5.

- cristaux blancs.
- Rdt = 76 %
- CCM: Rf = 0,38 (acétate / éther 2/8)
- T_{fus} = 72°C

IR (KBr; ν cm⁻¹) = 3273 (OH); 2984 (CH); 1619 (C=C).

-R.M.N ¹H (400 MHz; CDCl₃) δ ppm : 8,09(d large, 1H, J= 0,3 Hz, H-C₄); 7,62(dd, 1H, J= 9,1 Hz, J= 0,5 Hz, H-C₈); 7,22(dd, 1H, J= 9,1 Hz, J= 2,8 Hz, H-C₇); 7,04(d, 1H, J= 2,8 Hz, H-C₅); 6,17(ddt, 1H, J=17,2 Hz, J= 10,5 Hz, J= 5,3 Hz, HC=CH₂); 5,54(ddt, 1H, J= 17,2 Hz, J= 1,6 Hz, J= 1,6 Hz, H trans); 5,38(ddt, 1H, J = 10,5 Hz, J= 1,3 Hz, J= 1,3 Hz, H cis); 5,14(qd, 1H, J=6,5, J= 0,6 Hz, H-C(CH₃)OH); 5,07(ddd, 2H, J=5,5 Hz, J=1,6 Hz, J=1,3 Hz, OCH₂); 3,98(s, 3H, C₆-OCH₃); 1,52(d, 3H, J= 6,5 Hz, HC(OH)-CH₃).

-R.M.N ¹³C (100 MHz; CDCl₃) δ ppm : 164,33(C_{quat}, C₂); 157,73(C_{quat}, C₆); 142,81(C_{quat}, C_{8a}); 134,71 (H-C₄); 133,42 (H-C=CH₂); 127,66 (H-C₈); 125,19(C_{quat}, C_{4a} ou C₃); 122,58(C_{quat}, C₃ ou C_{4a}); 121,50(H-C₇); 117,03(H-C=CH₂); 106,53(H-C₅); 67,15(OCH₂); 66,10 (HC(CH₃)OH); 55,59 (C₆-OCH₃); 22,85 (HC(CH₃)OH).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour C₁₅H₁₇ N O₃

[M⁺] : 259,1208 ; trouvée : 259,1203

Bibliographie

Bibliographie

- 1-C.D.james, P.R. james, I.Mperial, *Chemical industries*, Eur, let. **1983**
- 2- A.M.Bouraiou, « *Mémoire de Magistère* », Université Mentouri-Constantine, **2004**
- 3-Y.L.Chen, Y.L.Zhao, C.M.Lu, C.C.Tzeng, J.P.Wang, *Bioorganic&Medicinal chemistry letters*, **2006**
- 4-M.J.S-Dewar, P.M.Maitlis, *J.Chem.Soc.* **1957**, 944
- 5- T.P.Blackburn, B.Cox, G.A.Guildford, All, *J.Med.Chem.* **1987**, 30, 2252-2259
- 6-R.Gatti, V Cavrini, P.Roveri, *Eur.J.Med.Chem.***1984**,19, 5, P.468-747
- 7-I.Chujo, Y.Masuda, K.Fujino, *Medicinal Chemistry.* 9 ,**2001**,3273-3286
- 8- A.R.Glennon, R.M. Slucher, A.R. Lyon, M.Titeler, S.Mckenney.*J.Chem*, **1986**, 29, 2375-2380
- 9-S. K. Kang. S S. Park. S. S. Kim. And all. *Tetraherdon Letters* .40, **1999**. 4379-4382
- 10- S. Matar, X. Frank, R. Hocquemiller, B. Figadere, *Tetrahedron letters*, **2004**, 45, 1881-1884.
- 11- D. Edmont, J.Chenaul, .*Syntett*, **2001**, 6, 833-835 .
- 12-H.Togo, M.Katohgi, *synlett*, **2001**,5, 565-581
- 13-G.Cabarrocas, Et all .*synlett*, **2000**, 5, 595-598
- 14-A.Jach San, O.Meth-Cohn, *J.Chem, Comm.***1995**, 1319
- 15- K. Kajinami, J. Koizumi, K. Ueda, S. Miyamoto, T. Takegoshi, H. Mabuchi, *Amer. J. Of Cardiol.* **2000**, 85, 178.
- 16-M.Martinez-Grueiro,C.Giménez-Pardo,A.Barrio, *Bioorganic&Medicinal chemistry letters*, **2005**, 219-224.
- 17- M.A.Fakhfakh, X.Franck., P.Duret, A.Pournet. B.Fugadère, *TetraherdonLetters*, **2001**.42,3847-3850
- 18-X.Franck, A.Fournet, E.Prima, R.Mahieux.R.Hocquimiller,B.Figader.*Science direct*, **2004**, 3635-3638.
- 19-A.Fournet, R.Mahieux, M.A.Fakhfakh, X.Franck. *Science direct*, **2003**, 891-894.
- 20-Caijo Frédéric, « *Thèse de Doctorat* », Université de Rennes, **2004**.
- 21-P.Mosset, « *Thèse de Docteur- ingénieur* », Université de Rennes, **1984**.

Chapitre 3
Préparation des Lactones
Quinoléiques

III-1:Introduction

Les dérivés quinoléiques représentent une classe importante parmi les composés organiques. Ils sont largement rencontrés dans la nature et certains d'entre eux ont montré un intérêt biologique et pharmacologique. Le norfloxacin¹ et le ciprofloxacine² sont des substances nécessaires pour la réplique et la transcription des composés bactériens d'ADN, avec une bonne pénétration dans le tissu. Ils sont aussi utilisés dans le traitement des infections des voies urinaires³. La découverte des quinolones représente un grand pas dans le développement de nouveaux dérivés chimiques possédant diverses propriétés biologiques et pharmacologiques.

Pour situer le cadre de notre travail, on exposera les données bibliographiques sur l'intérêt biologique des dérivés des quinolones, ainsi que les différentes méthodes de synthèse utilisées pour la préparation des quinolones. Les résultats obtenus et les différents commentaires auxquels nous sommes parvenus seront également présentés.

III-2: L'activité biologique des dérivés des quinolones

Les quinolones sont des antibactériens de synthèse caractérisés par un acide pyridone carboxylique. Le chef de file est l'acide nalidixique **1**⁴, il est utilisé depuis environ 20 ans pour le traitement des infections du tractus urinaire. La première génération de quinolones est essentiellement représentée par l'acide nalidixique et l'acide oxolinique **5**, mais le groupe de **Yasunori Tsuzuki** montre que les pyrrolidines chirales AG-7352 **2**, sont un agent antitumorale, efficace contre le cancer du sein ⁶

1

Acide Nalidixique

2

AG-7352

Les drogues Ciprofloxacine⁷ **3**, Miloxacine⁸ **4** et Ofloxacine **5**, qui sont généralement considérées comme antibiotiques et d'autre composés biologiquement actifs appartiennent à la deuxième génération des quinolones, le groupe alkyle qui est lié à l'atome d'azote joue un rôle important dans l'activité biologique de ces molécules et par conséquent, il renforce l'activité antibactérienne.

3

Ciprofloxacine

4

Miloxacine

5

Ofloxacine

Les **Quinolactacin A**, **B** et **C** ⁹ **6** contenant un squelette du pyrrolo [3,4-b] quinolone, ont été isolés dans le bouillon de fermentation de la contrainte fongique. La structure des quinolactacins est unique parce qu'un squelette de quinolone est conjugué avec un anneau de c-lactame. Tandis qu'une série de quinolactacins montre une activité antimicrobienne, mais Le quinolactacin **A1**, **A2** **7** est un inhibiteur contre la production de nécrose de tumeur.

Quinolactacin A: $R^1 = \text{Me}$, $R^2 = \text{H}$
Quinolactacin B: $R^1 = \text{H}$, $R^2 = \text{H}$
Quinolactacin C: $R^1 = \text{Me}$, $R^2 = \text{OH}$

Quinolactacin A1: $R^2 = \beta\text{-H}$
Quinolactacin A2: $R^2 = \alpha\text{-H}$

-Isaindigotidione **8** et indolizino[7,6,c]quinoléine **9**, sont deux produits naturels qui ont été isolés à partir du "*Isatis indigotica fort*" qui était utilisé en médecine chinoise traditionnelle contre les maux, telle que la grippe ¹⁰, est aussi très utilisé comme agent anticancéreux¹¹.

Isaindigotidione

indolizino[7,6,c]quinoléine

Un nombre considérable d'alcaloïdes médicinaux importants de quinoléine, a été isolé dans la famille de *Rutaceae*. Les exemples représentatifs de cette classe de composés incluent l'atanine **11**, l'araliopsine **10**. Ces types de produits ont montré une variété de propriétés biologiques comprenant les activités antiparasitaires et cytotoxique médicinale ¹².

araliopsine

atanine

Les dérivés du 4-hydroxy-1-alkyl-2(1H)-quinolone et le 3-alkyl-4-hydroxy-2(1H)-quinolone **12** et **13**, sont des composés hétérocycliques qui ont trouvé une importante utilisation dans les domaines biologique et pharmacologique¹³. Le 4-hydroxy-1-alkyl-2(1H)-quinolone **12** est un antagoniste des récepteurs de la glycine NMDA ¹⁴ et de la sérotonine (5-HT₃), alors que 3-alkyl-4-hydroxy-2(1H)-quinolone **13** est un antitumoral ¹⁵

4-Hydroxy-1-alkyl-2(1H)-quinolone
R=H, Et, Me, Ph

3-alkyl-4-hydroxy-2(1H)-quinolone
R=Me, Et, Ph

Le quinolone **14** ci-dessous 3-[5-(2-piperidin-1-yl-éthoxy)-1(H)-indol-2-yl]-2-(1H)-quinolone, possède une large activité dans le domaine biologique et plus particulièrement dans les domaines pharmacologique et thérapeutique. Il est largement utilisé dans le traitement des maladies diabétiques ¹⁶ et la décroissance des cellules tumorales.

3-[5-(2-Piperidin-1-yl-ethoxy)-1(H)-indol-2-yl]-2-(1H)-quinolone

Des tests biologiques sur les composés 1-alkyl-2-oxo-1,2-dihydroquinoléine-4-carboxyliques **15**, et les acides 2-alkoxyquinoléine-4-carboxylique **16** ont montré que ces derniers possèdent « *in vitro* » une activité thérapeutique dans les cas de la migraine et la schizophrénie¹⁷.

X=O, N
R=CH₃, CH₂CH₃, C₆H₅

Le 3-(1-phenyl-1-diéthylaminométhyl)-8-méthylcarbostyril **17** est utilisé comme anti-asthmatique. Dans les tests, sur un muscle du cœur du chat, 100 μ M de carbostyrile diminue les contractions du cœur de 58,7 ¹⁸.

17

III-3: Rappel bibliographique sur les méthodes de synthèse des quinolones

Les quinolones jouent un rôle extrêmement important dans le domaine de la chimie pharmaceutique, et se produisent dans de nombreux produits naturels. Il existe un nombre considérable de méthode de synthèse de ces quinolones, les plus importantes sont :

La réaction de **Baylis-Hillman**¹⁹ utilisée pour la préparation de 3-acétoxyméthyl-2(1H) quinolone **18** à partir de 2-nitrobenzaldehyde, dans cette réaction, les auteurs ont fait réagir le 2-nitrobenzaldehyde avec l'acrylate d'éthyle pour conduire à l'adduit de **Baylis-Hillman** qui réagit avec l'acide acétique en présence de 2 équivalents de Zinc en poudre et d'une quantité catalytique de l'acide tri-fluoroacétique à reflux 70°C pendant 12 heures (Schéma 1).

Schéma 1

Britt-marie et son groupe²⁰, ont préparé également des dérivés des quinolones selon la réaction de condensation de l'*o*-amino benzaldéhyde avec le malonate de méthyle à 140°C; conduit par cyclisation aux quinolones différemment substituées **19** (Schéma 2)

Schéma 2

Par un processus simple **Benoit-joseph** ²¹ et ses *coll* ont condensé les dérivés de l'aniline avec le chlorure de phenylacétyl pour former N-aryl-4-alkylbenzylamide qui sont soumis alors à l'action du réactif de Vielsmeier POCl₃ /DMF à 75°C, suivie d'une hydrolyse acide pour conduire aux quinolones suivants **20** (Schéma 3).

Schéma 3

Meth-Cohn et ses *coll*, ont utilisé le N-méthylformanilide ²² pour préparer les quinolones substitués avec une méthode différente et efficace. Ils ont traité le N-aryl-3,5-dihydrofuran-3-carboxamides en présence de l'acide de Lewis ²³, tandis que la deuxième méthode est un réarrangement photochimique très efficace pour conduire aux quinolones attendus **21** (Schéma 4)

Schéma 4

Il existe de nombreux exemples de transformation d'hétérocycles en quinolones. La première consiste à transformer le N-(3-butynolyl)-isatin en 2-oxo-3-vinyl-1,2-dihydroquinoléine-4-carboxylique²⁴ **22**, comme le montre le (Schéma 5) suivant :

Schéma 5

Lorsqu'un 3,3-diméthylisoxindole est chauffé à haute température, l'extension de ce cycle conduit au 2-quinolone **23** après l'élimination du groupement méthyle (Schéma 6)

Schéma 6

Une synthèse efficace a été développée pour l'obtention du 2-quinolone à partir de la quinoléine, à des températures supérieures à 200°C²⁵. L'attaque de nucléophile sur la position 2 de la quinoléine est plus facile surtout en présence d'un groupement partant en position 2, comme le chlore (Schéma 7).

Schéma 7

Le groupe de **Marsais** ²⁶ a synthétisé le 3-formyl-2-quinolone **24** en deux étapes. La séquence réactionnelle est résumée dans le (Schéma 8) ci-dessous.

Schéma 8

Au cours de ce travail, nous avons préparé les 3-formyl-2-quinolones **25** à partir des 2-chloro 3-formylquinoléines, en présence de l'acide chlorhydrique (4N) à reflux pendant 1h. Cette méthode constitue ²⁷ donc une voie d'accès simple et efficace à cette catégorie de composés.

Schéma 9

III-4 : Résultats et discussion

Les travaux réalisés par **Guenfoud. F**²⁸, concernant la synthèse des nouvelles lactones quinoléiques sont d'une grande importance.

Cependant, les objectifs fixés dans sa recherche n'ont pas été atteints par faute de temps. Néanmoins, il nous a semblé intéressant de continuer dans cette voie, pour généraliser les résultats originaux obtenus auparavant par **Guenfoud. F.** qui se résument comme suit :

La synthèse de cinq nouvelles lactones quinoléiques alkylés en position (9) par un groupement méthyle **26** et les résultats obtenus sont résumés dans le (Schéma 10).

- 26 -1** : R₁ = R₂ = R₃ = R₄ = H
26 -2 : R₁ = CH₃, R₂ = R₃ = H
26 -3 : R₁ = R₂ = H, R₃ = CH₃
26 -4 : R₁ = R₃ = H, R₂ = OCH₃
26 -5 : R₂ = R₃ = H, R₁ = OCH₃

Schéma 10

Pour notre part, l'objectif poursuivi est de compléter ces travaux par la synthèse de nouvelles lactones quinoléiques alkylées en position (9) par un groupement benzyle **27**. Ceci nous a permis de généraliser cette voie de synthèse originale et va nous permettre de procéder à des tests biologiques avec 2 catégories de produits, alkylés en position (9)

différemment substituées. D'une part avec un groupement méthyle et d'autre part avec un groupement benzyle, pour voir l'influence sur l'activité par le changement du groupement. Le schéma retrosynthétique **11**, résume les résultats obtenus :

Schéma 11

Il est connu dans les travaux de la littérature que les lactones quinoléiques ont montré des propriétés anti-fongique²⁹.

Aussi, avant de présenter les résultats obtenus en laboratoire, nous allons décrire quelques méthodes de synthèse de ces lactones quinoléiques connues dans les travaux antérieurs.

Parmi ces méthodes nous pouvons citer : le groupe **SP Rajendran**²⁹ qui a pu synthétiser des lactones quinoléiques insaturées substituées par une fonction amine **28** qui sont transformées en imines **29** par condensation avec le benzaldéhyde comme le montre le (Schéma 12).

- 29 -1** : $\text{R}_1 = \text{R}_2 = \text{R}_3 = \text{R}_4 = \text{H}$
29 -2 : $\text{R}_1 = \text{CH}_3$, $\text{R}_2 = \text{R}_3 = \text{H}$
29 -3 : $\text{R}_1 = \text{R}_2 = \text{H}$, $\text{R}_3 = \text{CH}_3$
29 -4 : $\text{R}_1 = \text{R}_3 = \text{H}$, $\text{R}_2 = \text{OCH}_3$
29 -5 : $\text{R}_2 = \text{R}_3 = \text{H}$, $\text{R}_1 = \text{OCH}_3$

Schéma 12

D'autres méthodes ont été utilisées pour la synthèse des lactones quinoléiques insaturées ³⁰ **30** et **31** la plus simple parmi celles-ci, consiste à condenser les dérivés de l'acide acétique avec les formyl-3-quinolones comme le montre le (Schéma 13).

Schéma 13

La deuxième méthode se base sur la condensation de l'acide malonique avec les chloro-2-formyl-3-quinoléines ³¹ en présence de la pyridine suivie d'une mono-décarboxylation et d'une cyclisation pour aboutir aux lactones insaturées **32** comme le montre le (Schéma 14).

Schéma 14

Enfin, le groupe **Zankowska. J**³² a synthétisé par une méthode simple et efficace en une seule étape par voie intramoléculaire une lactone quinoléique **33** substituée en 2 positions (9 et 10) comme le montre le (Schéma 15).

Schéma 15

1) Synthèse des quinolones

Nous avons cherché au cours de ce travail à dégager une nouvelle approche de la synthèse des quinolones lactones benzyliques, d'une séquence courte et efficace, en utilisant les quinolones qui sont préparés à partir de 2-chloro-3-formyl quinolones. Cette opération a été effectuée par chauffage à reflux dans une solution d'acide chlorhydrique (4N, HCl), ce qui conduit aux quinolones recherchés **2** avec un rendement supérieur à 80%, ce qui permet de masquer la position 2 de la quinoléine comme le montre le (Schéma 16) suivant :

Schéma 16

Les produits obtenus ont été recristallisés dans l'acide acétique. Les propriétés physiques des dérivés des quinolones ainsi que les rendements réalisés (calculés après la recristallisation) sont rassemblés dans le tableau 1.

Composé	Structure	Tfus(°C)	Rdt(%)
2-1		250	82
2-2		250	92
2-3		240	88
2-4		265	87
2-5		285	83

Tableau 1

On remarque dans cette réaction, que les quinolones sont obtenus avec des rendements très élevés. Toutes les données spectroscopiques RMN du proton, du carbone 13, Infra-rouge, et spectrométrie de masse sont en accord avec les structures des quinolones obtenus.

Les résultats sont rassemblés dans le tableau 2

Composé	Structure	Déplacement en ppm				
		H-C ₄	CHO	NH	CH ₃	OCH ₃
2-1		8,51	10,24	12,24	-----	-----
2-2		8,42	10,24	12,18	2,35	-----
2-3		8,46	10,45	9,42	2,51	-----
2-4		8,43	10,18	12,08	-----	3,89
2-5		8,45	10,25	12,17	-----	3,80

Tableau 2

Les spectres RMN ¹H des composés 3-formyl-2(1H)quinolones présentent tous un signal singulet qui apparaît dans la zone du champ faible entre 10,18-10,45 ppm, ceci correspond au groupement formyle (CHO), de même le proton (NH) donne dans tous les cas un signal singulet à champ faible vers 12,08-12,24 ppm, sauf dans le cas de l'ortho méthyle où nous avons remarqué une différence pour le proton de (NH) et cela est dû au voisinage du groupement méthyle du proton de l'amine du quinolone.

En ce qui concerne les groupements méthyles et méthoxyles liés aux noyaux quinolones, ils sortent sous forme de singulets vers la zone du champ fort à 2,35-251 ppm et 3,80-3,89 ppm.

2) Synthèse des oléfines :

Les quinolones synthétisés ont été transformés, par condensation avec l'acide de Meldrum en présence de pyridine, en oléfines **3** après 24 heures d'agitation à température ambiante. Ces réactions ont été réalisées avec de bon rendement, seulement la difficulté observée réside dans l'élimination de la pyridine car la moindre trace de pyridine empêche la purification et la cristallisation des oléfines obtenues. Les résultats obtenus sont résumés dans le schéma réactionnel **17**.

Schéma 17

Le mécanisme réactionnel est schématisé en 3 étapes comme suit (Schéma **18**) :

1)-formation d'énolate :

2) Addition nucléophile :

3) Déshydratation

Schéma 18

Pour l'intérêt de ces oléfines en synthèse totale des produits naturels³³, il nous a semblé nécessaire d'utiliser ce genre d'oléfin, dans la synthèse des quinolones lactones. Les produits obtenus ont été recristallisés dans l'acide acétique. Les propriétés physiques d'oléfin dérivées de l'acide de Meldrum ainsi que les rendements réalisés sont réunis dans le tableau 3.

Composé	Structure	Tfus(°C)	Rdt(%)
3-1		243	68
3-2		255	58
3-3		221	51
3-4		260	69
3-5		226	51

Tableau 3

Toutes les données spectroscopiques RMN, ^1H et ^{13}C , Infra-rouge et spectrométrie de masse sont en accord avec les structures des oléfines () obtenues. Les données de Résonance Magnétique Nucléaire des protons caractéristiques de ces composés confirment bien les structures proposées. Ceci concerne surtout les déplacements chimiques des protons de la double liaison notamment H-C₉ et H-C₄, NH, les protons de groupement méthyles et méthoxyles. Les résultats spectroscopiques sont rassemblés dans le tableau 4 suivant :

Oléfine	Structures	Déplacements chimiques en ppm					
		H-C ₉	H-C ₄	NH	CH ₃	OCH ₃	C(CH ₃) ₂
3-1		8,42	8,83	12,18	-----	-----	1,80
3-2		8,42	8,78	12,11	2,36	-----	1,79
3-3		8,43	8,82	11,38	2,44	-----	1,80
3-4		8,51	9,00	12,09	-----	3,87	1,77
3-5		8,78	9,00	12,11	-----	3,81	1,79

Tableau 4

En effet, on distingue pour les 5 produits préparés, dans la partie du champ faible, les signaux des protons (NH) sous forme d'un singulet entre 12,09-12,38 ppm. Les protons (H-C₄) apparaissent dans l'intervalle 8,78-9,00 ppm et sont plus déblindés par rapport aux (H-C₉) qui apparaissent entre 8,42-8,78 ppm. En ce qui concerne les (2CH₃-) du motif du cycle de Meldrum sont équivalents et sont déblindés par rapport aux méthyles liés aux noyaux quinoléiques, tandis que les groupements méthoxyles et méthyles résonnent entre 3,81-3,87 ppm et 2,36-2,34 ppm.

3) Synthèse des produits Alkylés :

L'intérêt de ces oléfines dérivées de l'acide de Meldrum obtenues dans l'étape précédente, réside dans leur réactivité très élevée, avec une gamme très importante de nucléophiles. Ceci permet la modélisation au niveau du carbone (9) de ces oléfines.

En effet, le nucléophile de choix, dans notre cas est le magnésien du chlorobenzyle préparé insitu qui réagit d'une manière régiosélective avec les différentes oléfines obtenues auparavant à 0°C dans le THF pendant 24 heures, pour conduire aux produits alkylés **4**.

Les rendements de ces réactions sont supérieurs à 50%, les résultats obtenus sont rassemblés dans le Schéma **19** suivant :

Schéma 19

Les produits obtenus sont purifiés par chromatographie sur colonne de gel de silice, en utilisant comme éluant l'acétate d'éthyle et l'éther de pétrole avec des proportions 80 / 20.

Les propriétés physiques des dérivés 2-(2-diméthyle-5-[1-(2-oxo-1,2-dihydroquinoléin-3-yl)-2-phényl-éther]-[1,3] dioxane-4,6-dione **4**, ainsi que les rendements réalisés (calculés après la purification) sont rassemblés dans le **tableau 5**.

Composé	Structure	Tfus(°C)	Rdt(%)
4-1		155	65
4-2		125,6	51
4-3		120	49
4-4		155	60
4-5		134	63

Tableau 5

Toutes les données spectroscopiques RMN ^1H , RMN ^{13}C , IR et spectrométrie de masse sont en accord avec les structures obtenues présentées dans le tableau 6 ci-dessous.

On note par exemple les déplacements chimiques des protons (NH), des (H-C₄), des (H-C₉), des (H-C₁₀), des groupements méthyles et méthoxyles et tout ce qui concerne les protons du motif cycle de Meldrum et le groupement (-CH₂Ph), qui figurent dans le même tableau cité ci-dessus.

Produits alkylés	Structure	Déplacement chimique des protons en ppm							
		H-C ₄	NH	H-C ₉	H-C ₁₀	CH ₂ -C ₉	CH ₃	OCH ₃	C-(CH ₃) ₂
4-1		7,91	10,50	3,81	3,18	2,55	-----	-----	1,79
4-2		7,90	11,00	4,40	3,61	3,00 à 2,55	2,35	-----	1,80
4-3		8,10	10,00	4,40	3,20	3,10 à 2,58	2,37	-----	1,79
4-4		8,12	11,50	4,28	3,20	3,00 à 2,55	-----	3,73	1,80
4-5		7,99	11,60	4,39	3,15	3,00 à 2,55	-----	3,74	1,79

Tableau 6

A partir de ce tableau, nous pouvons relever les points suivants :

- Le déplacement chimique du proton (NH), dans le cas du produit alkylé de la quinoléine substituée par un groupement méthyle en position 8 est sensiblement blindé 10 ppm par rapport aux autres protons (NH) des différents produits alkylés qui sont à notre avis déblindés et observés entre 10,50 et 11,60 ppm.

- Les deux groupements méthyles du motif cycle de Meldrum, sont blindés et équivalents et apparaissent dans un intervalle de 1,79 et 1,80 ppm, par rapport aux méthyles liés au noyau quinoléique qui apparaissent en 2,35 et 2,37 ppm.

- Tandis que les protons H-C₁₀ des différents produits alkylés **4**, apparaissent sous forme d'un multiplet pour les composés **4-1**, **4-3** par contre, ils apparaissent sous forme d'un doublet pour les composés **4-2**, **4-4**, et **4-5**.

- Concernant les protons du cycle benzylique et les protons du noyau quinoléique, ils apparaissent sous forme d'un massif non analysable dans des champs faibles entre 6,46 et 7,45 ppm, sauf pour le proton H-C₄ des différents produits alkylés où il est singulet blindé et apparaît entre 7,90 et 8,12 ppm.

- Pour les deux protons du groupement benzyle (Ph-CH₂), ils apparaissent sous forme d'un massif pour tous les cas des produits alkylés entre 2,55 et 3,10 ppm.

4) Synthèse des lactones quinoléiques :

Après avoir Alkylé les oléfines dérivées de l'acide de Meldrum par le magnésien du chlorobenzyle, dans l'étape précédente et obtenu cinq nouveaux produits, résultat de l'alkylation.

Chacun de ces produits est soumis à une hydrolyse par chauffage à reflux, pendant 24 heures dans un mélange (2 / 1) butanone – 3 / eau pour conduire directement aux lactones benzyliques **5** attendues avec de bon rendements, supérieurs à 50% pour chaque lactone obtenue pure après purification par chromatographie sur colonne de gel de silice. Les résultats obtenus sont rassemblés dans le (Schéma 20).

Schéma 20

Cette réaction passe par 3 étapes.

Tout d'abord une étape d'hydrolyse du motif du cycle de Meldrum en diacide, comme le montre le Schéma réactionnel suivant **21** :

Suivie d'une étape de monodécarboxylation dans laquelle il y a départ d'une molécule de dioxyde de carbone, pour conduire aux monoacides attendus, comme le montre le Schéma réactionnel 22.

La 3^{ème} et dernière étape, est la cyclisation *in situ* de ces acides en lactones attendues
 5. Le mécanisme de cyclisation est présenté par le (Schéma 23).

Schéma 23

Les produits obtenus sont purifiés par chromatographie sur colonne de gel de silice, en utilisant comme éluant MeOH et CH₂Cl₂ avec des proportions 10 / 90.

Les propriétés physiques des dérivés Acide 3-(2-oxo-1,2-dihydro-quinolin-3-yl)-4-phenylbutirique **5**, ainsi que les rendements réalisés (calculés après la purification) sont rassemblés dans le **tableau 7**.

Composé	Structure	Pdecom(°C)	Rdt(%)
5-1		≥280	67
5-2		≥290	68,29
5-3		≥280	50
5-4		≥280	50
5-5		≥290	64,8

Tableau 7

L'inconvénient de ces produits obtenus est dû à l'insolubilité des lactones benzyliques quinoléiques dans tous les solvants organiques sauf dans le DMSO qui permet de les solubiliser. Le second inconvénient réside dans l'ouverture de ces lactones par l'eau contenue dans le DMSO, ce qui conduit aux acides benzyliques **5**. Pour cela, nous avons caractérisé les formes ouvertes de ces lactones par la RMN du proton et du carbone 13, c'est-à-dire les acides correspondants.

Sauf pour la lactone **5-5**, qui est soluble dans le méthanol, donc elle est caractérisée sous forme lactonique.

Les données spectroscopiques du RMN du proton qui prouvent la caractérisation de la lactone et non pas sa forme ouverte, l'acide correspondant :

-La disparition du signal du proton (NH) qui apparaît d'habitude entre 10 et 12 ppm.

- Les deux protons portés par le carbone 10 lié au carbonyle de la lactone apparaissent sous forme d'un massif non analysable, par contre ces deux protons ne sont pas équivalents, dans le cas des formes acide et chacun d'entre eux, apparaît sous forme d'un doublet de doublet qui couplent entre eux avec une constante de couplage de l'ordre $J = 15,0$ Hz et couplent avec le H-C₉ avec 2 constantes différentes, l'une est de l'ordre de $J = 8,5$ Hz par contre l'autre constante de couplage n'a pas été détectée car le proton est masqué par le signal de l'eau contenue dans le DMSO.

Le tableau 8 rassemble les données spectroscopiques de certains protons caractéristiques de ces acides **5-1** à **5-4** et la lactone **5-5**.

-Les protons aromatiques du cycle benzylique et les protons du noyau quinoléique, apparaissent sous forme d'un massif non analysable du premier ordre entre 7,00 et 7,46 ppm, sauf pour le proton H-C₄ des différents noyaux quinoléiques qui apparaît dans la même zone déblindée entre 7,46 et 7,72 ppm.

-Les protons (NH) des différents noyaux quinoléiques des acides 5-1 à 5-4 apparaissent entre 10,86 et 11,74 ppm sous forme d'un doublet large et demeurent les protons les plus déblindés de ces molécules.

-Les deux protons benzyliques (Ph-CH₂) ne sont pas équivalents pour tous ces produits obtenus. Chacun d'eux apparaît sous forme d'un doublet de doublet aux environs de 3,00 ppm et couplent entre eux avec une constante de couplage environ de $J = 12$ Hz et chacun couple différemment avec le H-C₉ avec une constante de couplage qui varie de 6 à 8 Hz.

-Même chose pour les deux protons du carbone C₁₀ qui ne sont pas équivalents et qui couplent entre eux avec une constante de couplage $J = 15$ Hz environ et chacun d'entre eux couple différemment avec le H-C₉ avec une constante de couplage qui est de l'ordre $J = 8$ Hz.

Acides	Structure	Déplacement chimique des protons en ppm								
		H-C ₄	NH	H-C ₉	-CH ₂ -C ₉	CH ₃	O-CH ₃	CH ₂ CO ₂ H		
5-1		7,59	11,74	3,61	3,02	2,84	-----	-----	2,61 à 2,45	2,45 à 2,31
5-2		7,46	11,64	3,64 à 3,57	2,97	2,83	2,26	-----	2,45 à 2,40	2,36 à 2,32
5-3		7,62	10,86	3,58	3,07	2,86	2,41	-----	2,71	2,47
5-4		7,53	11,59	3,50	3,04	2,82	-----	3,78	2,67	2,47
5-5		7,72	-----	3,40	3,86	3,00	-----	3,80	2,60	

Tableau 8

III-5 : Conclusion

Dans cette troisième partie, nous avons donné un bref résumé bibliographique portant sur les intérêts biologique et pharmaceutique des quinolones et nous avons ciblé quelques méthodes de synthèse de ces différents produits.

En outre, nous avons préparé cinq nouvelles lactones quinoléiques benzyliques, ceci rentre dans la complémentarité du travail réalisé auparavant au laboratoire.

Avant de procéder à cette synthèse nous avons présenté les plus récentes méthodes existantes dans la littérature.

Les lactones obtenues au laboratoire sont caractérisées sous forme ouverte c'est-à-dire acide, sauf pour le cas de 5-5 qui est caractérisé sous sa forme lactonique.

Partie Expérimentale

Partie expérimentale

a) Préparation des quinolones

Mode opératoire

- on introduit dans un ballon de 100 ml équipé d'un barreau magnétique et d'un réfrigérant ascendant, 1,92 g (0,01 mole) de 2-chloro-3-Formyl quinoléine en solution dans 70 ml d'HCl (4N) et on laisse la réaction à reflux pendant 3 heures, le produit brut précipite. Après refroidissement, le précipité est filtré, lavé à l'eau distillée puis séché à l'air libre. Les produits bruts obtenus sont suffisamment purs, pour être utilisés ultérieurement. Ils sont recristallisés dans l'acide acétique.

2-1) 2-oxo-1, 2-dihydro-quinoléine-3-carbaldéhyde

2-1

- A partir de 1,92 g (0,01 mole) de 2-chloro-3-Formyl-quinoléine en solution dans 70 ml d'HCl (4 N), on obtient après recristallisation 1,39 g du produit **2-1**.

- Cristaux jaunes

- **Rdt** = 82 %

-**CCM** R_f = 0,46 (Acétate d'éthyle)

- **Tfus** = 250°C

- **I.R (KBr; ν cm^{-1}): 3270 (NH); 3151 (NH); 1687 (C=O); 1683 (C=O); 1621 (C=C).**

- **RMN ^1H (400 MHz; DMSO- d_6) δ ppm :** 12,24 (s large, 1H, $\underline{\text{NH}}$); 10,24 (s, 1H, $\underline{\text{CHO}}$); 8,51 (s, 1H, $\underline{\text{H-C}_4}$); 7,93 (dd, 1H, $J=7,9$ Hz, $J=1,4$ Hz; $\underline{\text{H-C}_8}$); 7,67 (ddd, 1H, $J=8,4$ Hz, $J=7,1$ Hz, $J=1,4$ Hz, $\underline{\text{H-C}_6}$); 7,37 (ddt, 1H, $J=8,4$ Hz, $J=1,1$ Hz, $J=0,7$ Hz, $\underline{\text{H-C}_5}$); 7,26 (ddd, 1H, $J=7,9$ Hz, $J=7,1$ Hz, $J=1,1$ Hz, $\underline{\text{H-C}_7}$).

-RMN ¹³C (100 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : 189,68 (CHO); 161,33 (CONH ou C₂); 142,36 (CH); 141,02 (Cquat, C₃); 133,61 (CH); 130,82 (CH); 125,48 (Cquat, C_{8a}); 122,58 (CH); 118,03 (Cquat, C_{4a}); 115,31 (CH).

2-2) 6-Méthyl-2-oxo-1,2-dihydro-quinoléine-3-carbaldéhyde

2-2

- A partir de 2,20 g (0,01 mole) de 2-chloro-3-Formyl-quinoléine en solution dans 74 ml d'HCl (4 N), on obtient après recristallisation 1,84 g du produit **2-2**

- Cristaux vert.
- **Rdt** = 92 %
- **CCM** Rf = 0,41 (Acétate d'éthyle)
- **Tfus** = 250°C

-I.R (KBr; ν cm⁻¹) : 3142 (NH); 2998 (CH); 1684 (C=O).

- RMN ¹H (400 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : 12,18 (s large, 1H, NH); 10,24 (s, 1H, CHO); 8,42 (d, 1H, J=0,8 Hz, H-C₄); 7,70 (dd, 1H, J=2,0 Hz, J=1,1 Hz, H-C₅); 7,50 (ddd, 1H, J=8,4 Hz, J=2,0 Hz, J=0,7 Hz, H-C₇); 7,27 (d, 1H, J=8,4 Hz, H-C₈); 2,35 (s, 3H, CH₃).

- RMN ¹³C (100 MHz; DMSO-d₆) δ ppm: 189,74 (CHO); 161,27(CONH ou C₂); 141,99 (CH, C₄); 139,16 (Cquat, C₃); 135,06 (CH, C₇); 131,68 (Cquat, C₆); 129,94 (CH, C₅); 125,39 (Cquat, C_{8a}); 117,98 (Cquat, C_{4a}); 115,24 (CH, C₈); 20,18 (CH₃).

2-3) 8-Méthyl-2-oxo-1,2-dihydro-quinoléine-3-carbaldéhyde

2-3

- A partir de 2,30 g (0,01mole) de 2-chloro-3-Formyl-8-méthyle quinoléine en solution dans 78,2 ml d'HCl (4 N), on obtient après recristallisation 1,84 g

- Cristaux Jaunes.

- **Rdt** = 88 %

- **CCM** Rf = 0,43 (Acétate d'éthyle)

- **Tfus** = 240C°

-I.R (KBr; ν cm⁻¹): 3157 (NH); 3037; 2858 (CH); 1687 (C=O); 1670 (C=O); 1609 (C=C).

- RMN ¹H (400 MHz; CDCl₃) δ ppm : 10,45 (s, 1H, CHO); 9,42 (s large, 1H, NH); 8,46 (s, 1H, H-C₄); 7,61 (ddq, 1H, J=7,8 Hz, J=2,1 Hz, J=6,6, H-C₅); 7,49 (ddq, 1H, J=7,4 Hz, J=1,4 Hz, J=0,8, H-C₇); 7,21 (ddq, 1H, J=7,8 Hz, J=7,4 Hz, J=0,5 Hz, H-C₆); 2,51 (s, 3H, CH₃).

- RMN ¹³C (100 MHz; CDCl₃) δ ppm : 189,37 (CHO); (CONH; Non Détecté); 143,52 (CH); 142,42 (Cquat); 134,99 (CH); 129,11 (CH); 125,49 (Cquat); 123,30 (CH, C₆); 123,05 (Cquat); 118,71 (Cquat); 16,58 (CH₃).

2-4) 7-Méthoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoléine-3-carbaldéhyde

2-4

- A partir de 2,02 g (9,83 mmole) de 2-chloro-3-Formyl-7-méthoxy quinoléine en solution dans 68,8 ml d'HCl (4 N), on obtient après recristallisation 1,6 g du produit **2-4**.

- Cristaux beige.

- **Rdt** = 87 %

- **CCM** Rf = 0,43 (Acétate d'éthyle)

- **Tfus** = 265°C

-I.R (KBr; ν cm⁻¹) : 3143 (NH); 3067; 2979 (CH); 1685 (C=O); 1665 (C=O); 1629 (C=C).

-RMN ¹H (400 MHz; CDCl₃) δ ppm : 12,08 (s large, 1H, NH); 10,18 (s, 1H, CHO); 8,43 (s large, 1H, H-C₄); 7,84 (d, 1H, J=8,8 Hz, H-C₅); 6,89 (dd, 1H, J=8,8 Hz, J=2,4 Hz, H-C₆); 6,82 (d, 1H, J=2,4 Hz, H-C₈); 3,86 (s, 3H, OCH₃).

-RMN ¹³C (100 MHz; CDCl₃) δ ppm : 189,24 (CHO); 163,78 (CONH; ou C₂); 161,75 (Cquat, C₇); 143,51 (Cquat, C₃); 142,18 (CH, C₄); 132,62 (CH); 122,42 (Cquat); 112,46 (CH); 112,44 (Cquat); 97,55 (CH, C₈); 55,62 (OCH₃).

2-5) 6-Méthoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoléine-3-carbaldéhyde

2-5

- A partir de 1,22 g (5,55 mmole) de 2-chloro-3-Formyl-6-méthoxy quinoléine en solution, dans 48 ml d'HCl (4 N), on récupère après recristallisation 0,92 g du produit **2-5**.

- Cristaux Jaune

- Rdt = 83 %

-CCM Rf = 0,59 (Acétate d'éthyle)

- T_{fus} = 285°C

-I.R (KBr; ν cm⁻¹) : 1712,48; 1687,41(C=O); 1637,27; 1617,98(C=C).

-RMN ¹H (400 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : 12,17 (s large, 1H, NH); 10,25 (s, 1H, CHO); 8,45 (s, 1H, H-C₄) ; 7,47 (dd, 1H, J=2,5 Hz, J=0,5 Hz, H-C₅); 7,33 (dd, 1H, J=9,0 Hz, J=2,5 Hz, H-C₇); 7,30 (dt, 1H, J=9,0 Hz, J=0,7 Hz, H-C₈); 3,80 (s, 3H, OCH₃).

-RMN ^{13}C (100 MHz; DMSO- d_6) δ ppm : 189,79 (CHO); 160,97 (CONH; ou C_2); 154,40 (Cquat, C_6); 141,65 (CH, C_4); 135,91 (Cquat, C_3); 125,61 (Cquat, C_{8a}); 123,59 (CH, C_7); 118,58 (Cquat, C_{4a}); 116,69 (CH, C_8); 110,99 (CH, C_5); 55,45 (OCH $_3$).

b) Préparation des oléfines

Mode opératoire général

- Dans un ballon de 100 ml équipé d'un barreau magnétique et d'un septum, on introduit 1,75 g (10,11 mmole) de 3-Formyl quinolone (substitué ou non) en solution, dans 34 ml de pyridine, puis on ajoute 2,12 g (14,72 mmole) soit 1,5 eq d'acide de Meldrum. La réaction est abandonnée sous agitation magnétique pendant 24 heures à température ambiante. Le produit brut précipite dans la solution de la réaction, il est filtré sur verre fritté, lavé 3 fois avec une solution d'HCl (4N), puis lavé à l'eau distillée pour éliminer toute trace de la pyridine. Les produits bruts sont recristallisés dans l'acide acétique.

3-1) 2,2-Diméthyl-5-(2-oxo-1,2-dihydro-quinoléin-3-ylméthylène)-[1,3]dioxane-4,6-dione:

3-1

- A partir de 2,8 g (0,016 mole) de 3-formyle quinolone **2-1** en solution dans un 54 ml de Pyridine, on ajoute 3,5 g (0,025 mole) soit 1,5 eq d'acide de Meldrum, on obtient après recristallisation 3 g de l'oléfine **3-1**.

- Cristaux Jaune très foncé.
- **Rdt** = 68 %
- **CCM** Rf = 0,56 (Acétate d'éthyle)
- **Tfus** = 243°C

-I.R (KBr; ν cm⁻¹) : 3144,37(NH); 2993,82 (CH); 1762,36; 1724,2 (C=O); 1660,6 (C=C).

-RMN ¹H (400 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : 12,18 (s, 1H, NH); 8,83 (t large, 1H, J=0,8 Hz, H-C₄) 8,42 (d, 1H, J = 0,8 Hz, C₃-CH=C); 7,77 (dd large, 1H, J = 8,2 Hz, J = 0,7 Hz, H-C₅); 7,64 (ddd, 1H, J = 8,2 Hz, J = 7,3 Hz, J=1,4 Hz, H-C₆); 7,35 (d large, 1H, J = 8,2 Hz, H-C₈); 7,26 (ddd, 1H, J = 8,0 Hz, J = 7,1 Hz, J=0,9 Hz, H-C₇); 1,80 (s, 6H, C(CH₃)₂).

-RMN ¹³C (100 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : 162,13 (CONH); 159,95 (CO); 159,56 (CO); 149,40 (CH, C₄); 144,92 (C₃-CH=C); 140,05 (Cquat, C_{8a}); 133,16 (CH, C₆); 129,66 (CH, C₅); 124,47 (Cquat, C_{4a}); 122,57 (CH, C₇); 118,24 (Cquat, C_{4a} ou CH=C); 117,57 (Cquat, C_{4a} ou CH=C); 115,25 (CH, C₈); 104,76 (CCH₃)₂); 26,96 (2C, CH₃).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour C₁₆H₁₃NO₅

[M⁺] : 299,0793 ; trouvée : 299,0786.

3-2) 2,2 Diméthyl-5-(6-méthyl-2-oxo-1,2-dihydro-quinoléin-3-ylméthylène)
[1,3] dioxane-4,6-dione :

3-2

- A partir de 0,54 g (0,029 mole) de 6-méthyl-3-Formyle quinolone **2-2** en solution dans 9,7 ml de pyridine, on ajoute 0,62 g (0,035 mole) soit 1,5 eq d'acide de Meldrum, on obtient après recristallisation 1,9 g de l'oléfine **3-2**.

- Poudre Orange

- Rdt = 58 %

-CCM : Rf = 0,43 (Acétate d'éthyle)

- T_{fus} = 255°C

-I.R (KBr; ν cm⁻¹) : 3151,5 (NH); 3023,73 (CH); 1738,4; 1726,2 (C=O); 1652,9 (C=C).

-RMN ¹H (400 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : 12,11 (s, 1H, NH); 8,78 (t large, 1H, J=0,7 Hz, H-C₄); 8,42 (d, 1H, J = 0,9Hz, C₃-CH=C); 7,54 (dq large, 1H, J = 1,7Hz, J = 0,6Hz, H-C₅); 7,48 (ddd, 1H, J = 8,4 Hz, J = 1,7 Hz, J=0,4 Hz, H-C₇); 7,26 (d, 1H, J = 8,4 Hz, H-C₈); 2,36 (s large, 3H, H₃C-C₆); 1,79 (s, 6H, C(CH₃)₂).

-RMN ¹³C (100 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : 162,19 (CONH); 159,90 (CO); 159,58 (CO); 149,56 (CH, C₄); 144,84 (C₃-CH=C); 138,22 (Cquat); 134,64 (CH); 131,68 (Cquat); 128,91 (CH); 124,29 (Cquat); 118,20 (Cquat); 117,27 (Cquat); 115,17 (CH); 104,71 (C(CH₃)₂); 26,93(2C, CH₃); 20,15 (CH₃-C₆).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour C₁₇H₁₅NO₅

[M⁺] : 313,0950 ; trouvée : 313,0952.

3-3) 2,2-Diméthyl-5-(8-méthyl-2-oxo-1,2-dihydro-quinoléin-3-ylméthylène)-[1,3] dioxone-4,6-dione:

- A partir de 1,42 g (0,0078 mole) de 8-méthyl-3-Formyle quinolone **2-3** en solution dans 25,5 ml de pyridine, on ajoute 1,64 g (0,0089 mole) soit 1,5 eq d'acide de Meldrum, pour obtenir 2 g de l'oléfine **3-3** après recristallisation.

- Cristaux Jaune foncé.

- Rdt = 51 %

-CCM : Rf = 0,40 (Acétate d'éthyle)

- T_{fus} = 221°C

-I.R (KBr; ν cm⁻¹) : 3237,9 (NH); 2994,91 (CH); 1754,94; 1729,83(C=O); 1617,98; 1644,98 (C=C).

-RMN ^1H (400 MHz; DMSO- d_6) δ ppm : 11,38 (s large, 1H, NH); 8,82 (d, 1H, $J = 0,7$ Hz, $\underline{\text{H-C}}_4$); 8,43 (d, 1H, $J = 0,9$ Hz, $\text{C}_3\text{-CH=C}$); 7,60 (dm, 1H, $J = 7,9$ Hz, $\underline{\text{H-C}}_5$); 7,49 (dtd, 1H, $J = 7,3$ Hz, $J = 0,8$ Hz, $J = 0,5$ Hz, $\underline{\text{H-C}}_7$); 7,17 (dd, 1H, $J = 7,9$ Hz, $J = 7,3$ Hz, $\underline{\text{H-C}}_6$); 2,44 (s, 3H, $\underline{\text{H}}_3\text{C -C}_8$); 1,80 (s, 6H, $\text{C}(\underline{\text{CH}}_3)_2$).

-RMN ^{13}C (100 MHz; DMSO- d_6) δ ppm : 171,92 ($\underline{\text{C}}_O$); 162,14 ($2\underline{\text{C}}_O$); 160,52 (C_{quat}); 159,61(C_O); 149,31 ($\text{C}_3\text{-CH=C}$); 145,53 ($\underline{\text{C}}\underline{\text{H}}$); 138,48 (C_{quat} , $\underline{\text{C}}_{8a}$); 134,34 ($\underline{\text{C}}\underline{\text{H}}$); 127,84 ($\underline{\text{C}}\underline{\text{H}}$); 124,10 (C_{quat} , $\underline{\text{C}}_3$); 122,39 ($\underline{\text{C}}\underline{\text{H}}$); 118,35 (C_{quat} , $\underline{\text{C}}_{4a}$ Ou $\text{CH}=\underline{\text{C}}$); 104,76 ($\underline{\text{C}}\underline{\text{C}}\underline{\text{H}}_3$) $_2$); 26,96 ($2\underline{\text{C}}$, $\text{C}(\underline{\text{C}}\underline{\text{H}}_3)_2$); 17,00 ($\underline{\text{C}}\underline{\text{H}}_3\text{-C}_8$).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour $\text{C}_{17}\text{H}_{15}\text{NO}_5$

$[\text{M}^+]$: 313,0950 ; trouvée : 313,0962.

3-4) 5-(7-Méthoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoléin-3-ylméthylène)-2,2-diméthyl-[1,3] dioxane-4,6-dione

3-4

- A partir de 0,632 g (3,11 mmole) de 7-methoxy-3-Formyle quinolone **2-4** en solution dans 10,5 ml de pyridine, on ajoute 0,653 g (4,53 mmole) soit 1,5 eq d'acide de Meldrum, on obtient après recristallisation 0,7 g d'oléfine **3-4**.

- Cristaux Jaune foncé.
- **Rdt** = 69 %
- **CCM** R_f = 0,44 (Acétate d'éthyle)
- **Tfus** = 260 °C

-I.R (KBr; ν cm^{-1}) : 3137,29 (NH); 2957,8 (CH); 1757,73; 1732,73($\text{C}=\text{O}$); 1654,8. 1606,6 ($\text{C}=\text{C}$).

-RMN ¹H (400 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : **12,09** (s large, 1H, NH); **9,00** (s, 1H, H-C₄) ; **8,51** (d, 1H, J = 0,7 Hz, C₃-CH=C) ; **7,71** (d, 1H , J = 8,8 Hz, H-C₅) ; **6,89** (dd, 1H, J = 8,8 Hz, J = 2,4 Hz, H-C₆) ; **6,83** (Pseudo d large, 1H , J = 2,4 Hz, H-C₈) ; **3,87** (s, 3H, OCH₃) ; **1,77** (s, 6H, C(CH₃)₂)

-RMN ¹³C (100 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : **163,90** (Cquat, C₇) ; **162,54** (CO) ; **160,65** (Cquat) ; **159,88** (CO) ; **150,05** (CH, C₄) ; **146,06** (CH) ; **142,90** (Cquat) ; **131,97** (CH) ; **120,38** (Cquat) ; **114,67** (Cquat) ; **112,74** (Cquat) ; **112,51** (CH) ; **104,42** (Cquat, CCH₃)₂) ; **97,58** (CH, C₈) ; **55,67** (OCH₃) ; **26,91** (2C, C(CH₃)₂).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour C₁₇H₁₅NO₆

[M⁺] : 329,0899 ; trouvée : 313,0903.

3-5) 5-(6-Méthoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoléin-3-ylméthylène)-2,2-diméthyl-[1,3]dioxane-4,6-dione

- A partir de 0,83 g (3,77 mmole) de 6-methoxy-3-formyle quinolone **2-5** en solution dans 14 ml de pyridine, on ajoute 0,8 g (3,89 mmole) soit 1,5 eq d'acide de Meldrum, on obtient après recristallisation 0,7 g d'oléfine **3-5**.

- Cristaux rouges

- Rdt = 51 %

- CCM Rf = 0,44 (Acétate d'éthyle)

- T_{fus} = 226°C

-I.R (KBr v cm⁻¹) : **3165,5** (NH); **3097,05** (CH); **1752,99**; **1728,1**(C=O); **1653,4** (C=C).

-RMN ¹H (400 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : **12,11** (s large, 1H, NH) ; **9,00** (s, 1H, H-C₄) ; **8,78** (d, 1H, J = 0,8 Hz, C₃-CH=C) ; **8,43** (d, 1H, J = 0,9 Hz, H-C₄) ; **7,33 -7,27** (m, 3H, H-C₅, H-C₇, H-C₈) ; **3,81** (s, 3H, OCH₃) ; **1,79** (s large, 6H, C(CH₃)₂).

- RMN ¹³C (100 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : **159,62** (CO) ; **159,56** (CO) ; **154,44** (Cquat, C₇) ; **149,63** (CH, C₄) ; **144,41** (C₃-CH=C) ; **134,96** (Cquat) ; **124,59** (Cquat) ; **123,26** (CH) ; **118,77** (Cquat) ; **117,31** (Cquat) ; **116,66** (CH) ; **109,82** (CH) ; **104,72** (Cquat, C(CH₃)₂) ; **55,48** (OCH₃) ; **26,95** (2C, C(CH₃)₂).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour C₁₇H₁₅NO₆

[M⁺] : 329,0899 ; trouvée : 313,0903.

c) Préparation des produits alkylés

Mode opératoire générale

-Dans un bicol de 100 ml équipé d'un barreau magnétique et d'un réfrigérant ascendant, relié à une valve à huile. Le montage est séché à la flamme sous vide, puis refroidi sous courant d'argon. On introduit 1 g (3,34 mmoles) d'oléfine quinoléique correspondante en solution, dans 30 ml de THF anhydre. La solution est refroidie à 0°C, puis on lui additionne 3 ml (3 eq) de **Ph CH₂Mg Cl** dans l'éther anhydre, goutte à goutte sous agitation magnétique et sous courant d'argon ; une fois l'addition terminée, le milieu réactionnel est abandonné pendant 1 heure sous agitation à 0°C puis 1 heure à température ambiante. Le mélange réactionnel est épuisé avec 4 ml d'HCl (1,3 N), ensuite il est repris avec 20 ml CH₂Cl₂, puis lavé 2 fois à l'eau distillée. Les phases organiques réunies sont séchées sur sulfate de sodium. Après filtration du solvant, le produit brut est purifié par chromatographie sur colonne de gel de silice en utilisant comme éluant l'acétate d'éthyle, et l'éther de pétrole (8/2 puis 7/3).

4-1) 2-diméthyle-5-[1-(2-oxo-1,2-dihydro-quinoléin-3-yl)-2-phényl-éthyl]-[1,3] dioxane-4,6-dione

4-1

-A partir de 1 g d'oléfine **3-1** en solution, dans 30 ml de THF et de 5 ml de PhCH₂MgCl (2 M), on obtient après purification 0,62 g du produit **4-1**.

- Cristaux Jaune très claire.

-Rdt = 65 %

-CCM Rf = 0,45 (Ac / Ep 8 / 2).

- T_{fus} = 155 °C

-I.R (KBr; ν cm⁻¹) : 3189 (NH) ; 2984 (CH) ; 1673 (C=O) ; 1588 (C=C).

-RMN ¹H (400 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : 10,50 (s large, 1H, NH) ; 7,91 (s large, 1H, H-C₄) ; 7,59-7,08 (m, 9H) ; 3,81 (m, 1H, HC₉) ; 3,18 (m, 1H, CH(CO₂)₂C(CH₃)₂) ; 2,55 (m, 2H, CH₂-Ph) ; 1,79 (s large, 6H, C(CH₃)₂).

- RMN ¹³C (100 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : 172,00 (s large, CO) ; 163,84 (Cquat, C₂) ; 138,80 (Cquat, C-Ph) ; 138,51 (Cquat, C₃) ; 135,96 (Cquat, C_{8a}) ; 129,59 (H-C₄) ; 128,60 (2 HCortho de Ph) ; 128,37 (2 HCmeta de Ph) ; 127,90 (H-C₇) ; 126,86 (Cquat, C_{4a}) ; 126,42 (H-C₅) ; 125,52 (H-Cpara de Ph) ; 124,00 (H-C₆) ; 120,30 (H-C₈) ; 106,80 (Cquat, C(CH₃)₂) ; 50,80 (H-C(CO₂)₂C(CH₃)₂) ; 33,90 (CH₂-Ph) ; 30,35 (H-C₉) ; 26,95 (2C, C(CH₃)₂).

-Spectrométrie de masse: L'ion moléculaire étant trop faible, la mesure de sa masse n'a pu être effectuée. Masse calculée pour C₁₉H₁₅NO₂

[M-C₄H₆O₃]⁺ : 289,12594 ; trouvée : 289,1255.

4-2) 2,2-diméthyle-5-[1-(6-méthyl-2-oxo-1,2-dihydro-quinoléin-3-yl)-2-phenyl-éthyl]-[1,3] dioxane-4,6-dione

-A partir de 0,6 g d'oléfine quinoléique **3-2** en solution, dans 13 ml de THF et de 2 ml de PhCH₂MgCl (2 M), on obtient 0,28 g du produit **4-2**.

- Cristaux Jaune très claire.

- **Rdt** = 51 %

-**CCM** R_f = 0,3 (Ac/Ep 8/2)

- **Tfus** = 125, 6°C

-I.R (KBr; ν cm⁻¹) : 3125 (NH) ; 2936 (CH) ; 1642 (C=O) ; 1550 (C=C).

-RMN ¹H (400 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : 11,00 (s large, 1H, NH) ; 7,90 (s large, 1H, H-C₄) ; 7,47-6,92 (m, 8H) ; 4,40 (d large, 1H, J= 2,8 Hz, CH(CO₂)₂C(CH₃)₂) ; 3,61 (m, 1H, H-C₉) ; 3,00-2,55 (m, 2H, CH₂-Ph) ; 2,35 (s, 3H, CH₃-C₆) ; 1,80 (s large, 6H, C(CH₃)₂).

- RMN ¹³C (100 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : 171,51 (s large, CO) ; 163,50 (Cquat, C₂) ; 138,80 (Cquat, C-Ph) ; 138,51 (Cquat, C₃) ; 133,20 (Cquat, C₆) ; 132,90 (Cquat, C_{8a}) ; 129,60 (H-C₄) ; 128,85 (H-C₇) ; 128,64 (2 H-Cortho de Ph) ; 128,30 (2 H-Cmeta de Ph) ; 127,12 (H-C₅) ; 125,51 (H-Cpara de Ph) ; 126,69 (Cquat, C_{4a}) ; 106,80 (Cquat, C(CH₃)₂) ; 50,79 (H-C(CO₂)₂C(CH₃)₂) ; 33,52 (CH₂-Ph) ; 30,30 (H-C₉) ; 26,10 (2C, C(CH₃)₂) ; 21,35 (CH₃-C₆).

-Spectrométrie de masse: L'ion moléculaire étant trop faible, la mesure de sa masse n'a pu être effectuée. Masse calculée pour C₂₀H₁₇NO₂
[M-C₄H₆O₃]⁺ : 303,12593 ; trouvée : 303,1273.

4-3) 2-2diméthyle-5-[1-(8-méthyl-2-oxo-1,2-dihydro-quinoléin-3-yl)-2-phenyl-éthyl]-[1,3] dioxane-4,6-dione

-A partir de 0,6 g d'oléfine quinoléique **3-3** en solution, dans 22 ml de THF et de 3,5 ml de PhCH₂MgCl (2 M), on obtient après purification 0,36g du produit **4-3**.

- poudre Jaune claire.

- **Rdt** = 49 %

- **CCM Rf** = 0,35 (Ac/Ep 8/2)

- **Tfus** = 120 °C

-I.R (KBr; ν cm⁻¹) : 3114 (NH) ; 2956 (CH) ; 1749 (C=O) ; 1642 (C=C).

-RMN ¹H (400 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : 10,00 (s large, 1H, NH) ; 8,10 (s large, 1H, H-C₄) ; 7,21-6,83 (m, 8H) ; 4,40 (m, 1H, HC₉) ; 3,20 (m, 1H, CH(CO₂)₂C(CH₃)₂) ; 3,10-2,58 (m, 2H, CH₂-Ph) ; 2,37 (s, 3H, CH₃-C₆) ; 1,79 (s large, 6H, C(CH₃)₂).

-RMN ¹³C (100 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : 172,11 (s large, CO) ; 164,00 (Cquat, C₂) ; 139,14(Cquat, C₃) ; 138,80 (Cquat, C-Ph) ; 136,66 (Cquat, C_{8a}) ; 129,60 (H-C₄) ; 129,49 (Cquat, C₈) ; 128,64 (3C, H-C_{meta} de Ph, H-C₇) ; 128,33 (2 HC_{ortho} de Ph) ; 126,72 (Cquat, C_{4a}) ; 125,50 (H-C_{para} de Ph) ; 123,39 (H-C₅) ; 123,90 (H-C₆) ; 106,80 (Cquat, C(CH₃)₂) ; 51,00 (H-C(CO₂)₂C(CH₃)₂) ; 34,02 (CH₂-Ph) ; 30,29 (H-C₉) ; 26,11 (2C, C(CH₃)₂) ; 12,20 (CH₃-C₈).

-Spectrométrie de masse: L'ion moléculaire étant trop faible, la mesure de sa masse n'a pu être effectuée. Masse calculée pour C₂₀H₁₇NO₂

[M-C₄H₆O₃]⁺ : 303,12593 ; trouvée : 303,1255.

4-4) 5-[1-(7-méthoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoléin-3-yl)-2-phényl-éthyl-éthoxy]-2,2-diméthyl-[1,3]dioxane-4,6-dione

-A partir de 0,6 g d'oléfine **3-4** en solution, dans 20 ml de THF et de 2,5 ml de PhCH₂MgCl (2 M), on obtient après purification 0,4 g du produit **4-4**.

- poudre jaune très claire
- **Rdt** = 60 %
- **CCM** Rf = 0,4 (Ac/Ep 8/2)
- **Tfus** = 155°C

-I.R (KBr; ν cm⁻¹) : 3112 (NH) ; 2925 (CH) ; 1744 (C=O) ; 1642 (C=C).

-RMN ¹H (400 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : **11,50** (s large, 1H, NH) ; **8,12** (s large, 1H, H-C₄) ; **7,21-6,46** (m, 8H) ; **4,28** (m, 1H, H-C₉) ; **3,73** (s, 3H, OCH₃-C₇) ; **3,20** (d large, 1H, J= 2,6 Hz, CH(CO₂)₂C(CH₃)₂) ; **3,00-2,55** (m, 2H, CH₂-Ph) ; **1,80** (s large, 6H, C(CH₃)₂).

-RMN ¹³C (100 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : **175,05** (s large, C=O) ; **162,20** (Cquat, C₂) ; **161,44** (Cquat, C₇) ; **138,80** (Cquat, C-Ph) ; **138,49** (Cquat, C₃) ; **136,91** (Cquat, C_{8a}) ; **129,60** (H-C₄) ; **128,63** (2 H-C_{meta} de Ph) ; **128,31** (2 H-C_{ortho} de Ph) ; **127,39** (H-C₅) ; **125,80** (H-C_{para} de Ph) ; **119,18** (Cquat, C_{4a}) ; **109,01** (H-C₆) ; **106,82** (Cquat, C(CH₃)₂) ; **105,79** (H-C₈) ; **56,00** (OCH₃-C₇) ; **50,82** (H-C(CO₂)₂C(CH₃)₂) ; **33,94** (CH₂-Ph) ; **30,31** (H-C₉) ; **26,10** (2C, C(CH₃)₂).

-Spectrométrie de masse: L'ion moléculaire étant trop faible, la mesure de sa masse n'a pu être effectuée. Masse calculée pour C₂₀H₁₇NO₃
[M-C₄H₆O₃]⁺ : 319,12084 ; trouvée : 303,1176.

4-5) 5-[1-(6-méthoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoléin-3-yl)-2-phényl-éthyl-éthoxy]-2,2-diméthyl-[1,3]dioxane-4,6-dione

4-5

-A partir de 0,6 g d'oléfine **3-5** en solution, dans 20 ml de THF et de 2,5 ml de PhCH₂MgCl (2 M), on obtient après purification 0,45 g du produit **4-5**.

- poudre jaune fonce
- **Rdt** = 63 %
- **CCM** : Rf = 0,44 (Ac/ Ep 8/2)
- **Tfus** = 134°C

-I.R (KBr; ν cm⁻¹) : 3124 (NH); 2936 (CH) ; 1724 (C=O) ; 1665 (C=C).

-RMN ¹H (400 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : 11,60 (s large, 1H, NH) ; 7,99 (s large, 1H, H-C₄) ; 7,48-6,63 (m, 8H); 4,39 (m, 1H, H-C₉); 3,73 (s, 3H, OCH₃-C₇); 3,15 (d large, 1H, J= 2,7 Hz, CH(CO₂)₂C(CH₃)₂); 3,00-2,55 (m, 2H, CH₂-Ph); 1,79 (s large, 6H, C(CH₃)₂).

-RMN ¹³C (100 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : 171,12 (s large, CO); 164,63 (Cquat, C₂); 157,50(Cquat, C₆); 138,79 (Cquat, C-Ph); 138,50 (Cquat, C₃); 129,60 (H-C₄); 128,65 (2 H-Cmeta de Ph); 128,30 (2 H-Cortho de Ph); 128,22 (Cquat, C_{8a}); 127,78 (Cquat, C_{4a}); 125,81 (H-Cpara de Ph); 121,30 (H-C₈); 113,05 (H-C₇); 112,01 (H-C₅); 106,82 (Cquat, C(CH₃)₂); 56,03 (OCH₃-C₇); 50,80 (H-C(CO₂)₂C(CH₃)₂); 33,91 (CH₂-Ph); 30,30 (H-C₉); 26,15 (2C, C(CH₃)₂).

-Spectrométrie de masse: L'ion moléculaire étant trop faible, la mesure de sa masse n'a pu être effectuée. Masse calculée pour C₂₀H₁₇NO₃
[M-C₄H₆O₃]⁺ : 319,12084 ; trouvée : 303,1201.

d) Préparations des lactones quinoléiques

Mode opératoire général

On introduit 700 mg (1,77 mmole) du produit alkylé (substitué ou non) en solution dans un mélange Butanone-3 /eau (2 /1), soit 13,5 ml de pantanone-3 et 6,8 ml d'eau distillée .Le mélange réactionnel est chauffé à reflux pendant 24 heures, après refroidissement et décantation de l'eau, on reprend la phase organique avec l'acétate d'éthyle, et on lave 2 fois à l'eau distillée. Les phases organiques réunies sont séchées sur Sulfate de Sodium. Après filtration et distillation du solvant sous vide, le produit brut est purifié par chromatographie sur colonne de gel de silice en utilisant comme éluant CH₂Cl₂ / MeOH (90 / 10).

5-1) Acide -3-(2-oxo-1,2-dihydro-quinoléin-3-yl)-4-phenyl-butyrique

-A partir de 700 mg (1,77 mmole) du produit alkylé composé **4-1** en solution dans 13,5 ml de butanone-3 et 6,8 ml d'eau distillée, on obtient 360 mg d'acide **5-1**.

- poudre blanche
- **Rdt** = 67 %
- **CCM** Rf = 0,39 (CH₂Cl₂ / MeOH, 5/5)
- **P** Décomposition ≥ 280 °C

-I.R (KBr; ν cm⁻¹): 3403 (OH) ; 3028 (NH) ; 2998 (CH) ; 1644 (C=O) ; 1570 (C=C).

-RMN ¹H (400 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : **11,74** (s large, 1H, NH); **7,59** (s large, 1H, H-C₄); **7,52** (d large, 1H, J = 7,7 Hz, H-C₅); **7,40** (ddd large, 1H, J = 7,7 Hz, J = 7,7 Hz, J = 0,7 Hz, H-C₆); **7,27** (d large, 1H, J = 8,2 Hz, H-C₈); **7,19** (ddm, 2H, J = 7,4 Hz, J = 7,3 Hz, Hmeta de Ph); **7,16-7,05** (m, 4H, Hortho et para de Ph et H-C₇); **3,61** (pentuplet large

masqué par le signal de H₂O, 1H, J = 7,8 Hz, HC-CH₂COOH); **3,02** (dd large, 1H, J = 12,8 Hz, J = 7,8 Hz, CH₂-Ph); **2,84** (dd large, 1H, J = 12,8 Hz, J = 6,5 Hz, CH₂-Ph); **2,61-2,45** (m, masqué par le signal de DMSO, 1H, CH₂-COOH); **2,45-2,31** (m, 1H, CH₂-COOH).

-RMN ¹³C (100 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : **175,21** (C_{quat}, CO₂H); **161,68** (CONH); **140,26**(C_{quat}, Ph); **137,39** (C_{quat}, C_{8a}); **135,35** (CH, C₇); **129,11** (CH, C₇); **128,92** (2CHortho de Ph); **127,88** (2CHmeta de PH); **127,20**(CH, C₇); **125,62**(C Hpara de Ph); **121,45** (HC, C₇); **119,18** (C_{quat}, C₇); **114,47**(CH, C₇); **38,62**(CH₂-Ph); **37,95** (CH-CH₂COOH); **37,00** (CH₂ CO₂H).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour C₁₉H₁₇NO₃
M+. (C₁₉H₁₇NO₃) : 307,12084 ; trouvée : 307,1183.

5-2) Acide -3-(6-méthyl-2-oxo-1,2-dihydro-quinoléin-3-yl)-4-phenyl-butyrrique

-A partir de 550 mg (1,30 mmole) du produit alkylé composé **4-2** en solution dans 10,8 ml de butanone-3 et 5,5 ml d'eau distillée, on obtient 300 mg d'acide **5-2**.

- poudre blanche
- **Rdt** = 68,29 %
- **CCM:** Rf = 0,39 (CH₂Cl₂ / MeOH, 5/5)
- **P** Décomposition ≥ 290 °C

-I.R (KBr; ν cm⁻¹) : **3418** (OH) ; **3011** (NH) ; **2991** (CH) ; **1651** (C=O) ; **1563** (C=C).

-RMN ¹H (400 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : **11,64** (s large, 1H, NH); **7,46** (s, 1H, H-C₄) ; **7,26-7,05** (m, 8H); **3,61** (quantuplet, 1H, J = 7,0 Hz, HC-CH₂COOH); **2,97** (dd large,

1H, J = 12,3 Hz, J = 8,0 Hz, $\underline{\text{CH}_2\text{-Ph}}$); **2,83** (dd large, 1H, J = 12,4 Hz, J = 6,0 Hz, $\underline{\text{CH}_2\text{-Ph}}$); **2,45-2,43** (m, 1H, $\underline{\text{CH}_2\text{-COOH}}$); **2,36-2,30** (m, 1H, $\underline{\text{CH}_2\text{-COOH}}$); **2,26** (s, 3H, $\underline{\text{CH}_3\text{-C}_6}$).

-RMN ^{13}C (100 MHz; DMSO- d_6) δ ppm : **187,69** (Cquat, $\underline{\text{COOH}}$); **161,63**(Cquat, $\underline{\text{C}_2}$); **140,38**(Cquat, $\underline{\text{C-Ph}}$); **135,35** (Cquat, $\underline{\text{C}_3}$); **135,33** (Cquat, $\underline{\text{C}_6}$); **135,07** (Cquat, $\underline{\text{C}_{8a}}$); **130,28** ($\underline{\text{CH, C}_8}$); **128,94** (2 $\underline{\text{HC}_{\text{meta}}$ de Ph); **127,79** (2 $\underline{\text{HC}_{\text{ortho}}$ de Ph); **126,71** ($\underline{\text{HC, C}_5}$); **125,51** ($\underline{\text{HC, C}_7}$); **125,49** ($\underline{\text{HC}_{\text{para}}$ de Ph); **119,15** ($\underline{\text{HC, C}_4}$); **114,36** ($\underline{\text{CH, C}_8}$); **38,51**($\underline{\text{CH}_2\text{-Ph}}$); **38,48** ($\underline{\text{CH}_2\text{-COOH}}$); **38,00** ($\underline{\text{CH-CH}_2\text{COOH}}$); **20,26** ($\underline{\text{CH}_3\text{-C}_6}$).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour $\text{C}_{20}\text{H}_{19}\text{NO}_3$

M^+ . ($\text{C}_{20}\text{H}_{19}\text{NO}_3$) : 321,13649 ; trouvée : 321,1364.

5-3) Acide -3-(8-méthyl-2-oxo-1,2-dihydro-quinoléin-3-yl-)-4-phenyl-butérique

-A partir de 500 mg (1,26 mmole) du produit alkylé composé **4-3** en solution dans 10 ml de butanone-3 et 6 ml d'eau distillée, on obtient 168 mg d'acide **5-3**.

- poudre blanche
- **Rdt** = 50 %
- **CCM:** $R_f = 0,4$ ($\text{CH}_2\text{Cl}_2 / \text{MeOH } 9, 5/5$)
- **P** Décomposition ≥ 280 °C

-I.R (KBr; $\nu \text{ cm}^{-1}$) : **3415** (OH) ; **3005** (NH) ; **2958** (CH) ; **1671** (C=O) ; **1568** (C=C).

-RMN ^1H (400 MHz; DMSO- d_6) δ ppm : **10,86** (s large, 1H, $\underline{\text{NH}}$); **7,62** (s large, 1H, $\underline{\text{H-C}_4}$) ; **7,41** (dm, 1H, J = 7,8 Hz, $\underline{\text{H-C}_5}$) ; **7,27** (dq large, 1H, J = 7,3 Hz, J = 0,7 Hz, $\underline{\text{H-C}_7}$); **7,23** (ddm, 2H, J= 7,5 Hz, J= 7,2 Hz, $\underline{\text{H}}$ meta de Ph) ; **7,17-7,10** (m, 3H, $\underline{\text{H}}$ ortho et para de

Ph); **7,04** (dd, 1H, J = 7,8 Hz, J = 7,3 Hz, $\underline{\text{H-C}}_6$); **3,58** (dddd, 1H, J = 8,6 Hz, J = 7,8 Hz, J = 6,9 Hz, J = 6,2 Hz, $\underline{\text{HC-CH}_2\text{COOH}}$); **3,07** (dd, 1H, J = 13,4 Hz, J = 7,8 Hz, $\underline{\text{CH}_2\text{-Ph}}$); **2,86** (dd, 1H, J = 13,4 Hz, J = 6,9 Hz, $\underline{\text{CH}_2\text{-Ph}}$); **2,71** (dd, 1H, J = 15,8 Hz, J = 8,6 Hz, $\underline{\text{CH}_2\text{-COOH}}$); **2,47** (dd, 1H, J = 15,8 Hz, J = 6,2 Hz, $\underline{\text{CH}_2\text{-COOH}}$); **2,41** (s, 3H, $\underline{\text{CH}_3\text{-C}_8}$).

-RMN ^{13}C (100 MHz; DMSO- d_6) δ ppm : **161,89** (Cquat, $\underline{\text{CO}_2\text{H}}$); **161,11** (Cquat, $\underline{\text{CONH}}$); **139,81** (Cquat, $\underline{\text{Ph}}$); **136,41** ($\underline{\text{CH}}$, $\underline{\text{C}_4}$); **135,93** (Cquat, $\underline{\text{C}_{8a}}$); **133,91** (Cquat, $\underline{\text{C}_3}$); **130,62** ($\underline{\text{CH}}$, $\underline{\text{C}_7}$); **128,87** ($2\underline{\text{CH}}$ ortho de Ph); **128,04** ($2\underline{\text{CH}}$ meta de Ph); **125,84** ($\underline{\text{CH}}$ para de Ph); **125,42** ($\underline{\text{CH}}$, $\underline{\text{C}_5}$); **122,83** (Cquat, $\underline{\text{C}_{4a}}$ ou $\underline{\text{C}_8}$); **121,37** ($\underline{\text{HC}}$, $\underline{\text{C}_6}$); **119,05** (Cquat, $\underline{\text{C}_{4a}}$ ou $\underline{\text{C}_8}$); **38,53** ($\underline{\text{CH}_2\text{-Ph}}$); **37,98** ($\underline{\text{CH-CH}_2\text{COOH}}$); **37,08** ($\underline{\text{CH}_2\text{-CO}_2\text{H}}$); **17,02** ($\underline{\text{CH}_3\text{-C}_8}$).

-Spectrométrie de masse: Masse calculée pour $\text{C}_{20}\text{H}_{19}\text{NO}_3$

M^+ . ($\text{C}_{20}\text{H}_{19}\text{NO}_3$) : 321,13649 ; trouvée : 321,1333.

5-4) Acide -3-(7-méthoxy-2-oxo-1,2-dihydro-quinoléin3-yl)-4-phenylbutyrique

-A partir de 750 mg (1,78 mmole) du produit alkylé composé **4-4** en solution dans 18 ml de butanone-3 et 8 ml d'eau distillée, on obtient 280 mg d'acide **5-4**.

- poudre blanche
- **Rdt** = 50 %
- **CCM:** Rf = 0,36 (CH_2Cl_2 / MeOH 9, 5/5)
- **P** Décomposition ≥ 280 °C

-I.R (KBr; ν cm^{-1}) : **3424** (OH) ; **3014** (NH) ; **2921** (CH) ; **1637** (C=O) ; **1565** (C=C).

-RMN ^1H (400 MHz; DMSO- d_6) δ ppm : **11,59** (s, 1H, $\underline{\text{NH}}$); **7,53** (s large, 1H, $\underline{\text{H-C}_4}$); **7,47** (d, 1H, J = 8,6 Hz, $\underline{\text{H-C}_5}$); **7,26-7,19** (m, 2H, $\underline{\text{H}}$ meta de Ph); **7,16-7,10** (m, 3H, $\underline{\text{H}}$ ortho et para de Ph); **6,77** (d large, 1H, J = 2,4 Hz, $\underline{\text{H-C}_8}$); **6,74** (dd, 1H, J = 8,6 Hz, J =

2,4 Hz, $\underline{H-C_6}$); **3,78** (s, 3H, $\underline{OCH_3-C_7}$). **3,50** (dddd, 1H, J = 8,5 Hz, J = 7,6 Hz, J = 6,9 Hz, J = 6,3 Hz, $\underline{HC-CH_2COOH}$); **3,04** (dd, 1H, J = 13,4 Hz, J = 7,6 Hz, $\underline{CH_2-Ph}$); **2,82** (dd, 1H, J = 13,4 Hz, J = 6,9 Hz, $\underline{CH_2-Ph}$); **2,67** (dd, 1H, J = 15,7 Hz, J = 8,5 Hz, $\underline{CH_2-COOH}$); **2,47** (dd, 1H, J = 15,7 Hz, J = 6,3 Hz, $\underline{CH_2-COOH}$).

-RMN ^{13}C (100 MHz; DMSO- d_6) δ ppm : **161,74** (Cquat, $\underline{CO_2H}$); **160,28** (Cquat, $\underline{C_7}$); **139,94** (Cquat, $\underline{Ph}$); **139,21** (Cquat, $\underline{C_{8a}}$); **135,63** ($\underline{CH, C_4}$); **130,87** (Cquat, $\underline{C_3}$); **128,87** (2 $\underline{CH}$ ortho de Ph); **128,67** ($\underline{HC, C_5}$); **128,01** (2 $\underline{CH}$ meta de PH); **125,79** ($\underline{CH}$ para de Ph); **113,21** (Cquat, $\underline{C_{4a}}$); **110,36** ($\underline{HC, C_6}$); **97,40** ($\underline{H-C, C_8}$); **55,17** ($\underline{OCH_3-C_7}$); **38,59** ($\underline{CH_2-Ph}$); **38,12** ($\underline{CH-CH_2COOH}$); **37,09** ($\underline{CH_2-CO_2H}$).

-Spectrométrie de masse: L'ion moléculaire étant trop faible, la mesure de sa masse n'a pu être effectuée. Masse calculée pour $C_{18}H_{16}NO_2$
 $[M-CH_2COOH]^+$: 278,11810 ; trouvée : 278,1178.

5-5) 4-Benzyl-6-methoxy-3,4-dihydro-1-oxa-9-aza-anthracen-2-one

5-5

-A partir de 700 mg (1,66 mmole) du produit alkylé composé **4-5** en solution dans 13,5 ml de butanone-3 et 7 ml d'eau distillée, on obtient 280 mg d'acide **5-5**.

- Poudre jaune claire
- **Rdt** = 64,8 %
- **CCM** R_f = 0,43 (CH_2Cl_2 / MeOH 9, 5/5)
- **P** Décomposition ≥ 290 °C

-IR (KBr; ν cm^{-1}): **3021** (NH); **2939** (CH); **1658** (C=O); **1584** (C=C).

-RMN ¹H (400 MHz; DMSO-d₆) δ ppm : 7,72 (s large, 1H, H-C₄) ; 7,35-6,97 (m, 8H) ; 3,86 (pentuplet, 1H, J = 7,0 Hz, CH-CH₂-PH) ; 3,80 (s, 3H, OCH₃-C₆) ; 3,00 (dd large, 1H, J = 13,5 Hz, J = 7,4 Hz, CH₂-Ph) ; 2,86 (dd large, 1H, J = 13,5 Hz, J = 7,5 Hz, CH₂-Ph) ; 2,60 (d large, 2H, J = 7,2 Hz, CH₂-CO).

-RMN ¹³C (100 MHz; CD₃OD) δ ppm : 164,51 (Cquat, CO) ; 164,22 (Cquat, C₆) ; 156,90 (Cquat, C₂) ; 141,20 (Cquat) ; 138,57 (CH) ; 137,52 (Cquat) ; 132,67 (Cquat) ; 130,34 (2CHortho de Ph) ; 129,21 (2CHmeta de PH) ; 127,13 (CHpara de Ph) ; 122,40 (Cquat, C_{4a}) ; 120,89 (HC) ; 117,59 (HC) ; 109,41 (HC) ; 56,09 (OCH₃-C₆) ; 49,25 (CH-CH₂-Ph) ; 41,39 (CH₂-Ph) ; 30,80 (CH₂-CO).

Spectrométrie de masse: L'ion moléculaire étant trop faible, la mesure de sa masse n'a pu être effectuée. Masse calculée pour C₁₃H₁₀NO₃
[M-C₇H₇]⁺ : 228,06607 ; trouvée : 228,0664.

Bibliographie

Bibliographie

- 1-G.Y Leshner , F. Grutt, M.D. Bailey, J.H. Brumalage, R.J.R.*Med.Chem* ,**1962**,5,1063.
- 2-E. Stern, R. Millet, P. Depreux, *Tetrahedron letters*, **2004**, 9257-9259.
- 3-C.G.Lee, K.Y. Lee, S.G.Sankar , J. N. Kim, *Tetrahedron letters*, 45, **2004**, 7409-7413.
- 4- G.Y.Leshner, E.J.Froelish, M.D.Gruett, G.H.Bailey, *Med Chem*, 5, **1962**,1063.
- 5-D.Kaminsh.,R.Murayama, R.I.J.*Med.Chem*,**1968**,11,160.
- 6-Y.Tsuzuki, K.Chiba, H.Katsuhiko , *Tetrahedron letters*, 12, **2001**, 1793-1799.
- 7-K.Grohe,H. Heitzer, S.Leibigs ,*Ann.Chem*, **1987**,29.
- 8-Z.Wang, J.Zhang, *Tetrahedron letters*, 46, **2005**, 4997-4999.
- 9-S.J.Park, K.N.Cho, W.G.Kim, *Tetrahedron letters*, 45, **2004**, 8793-8795.
- 10-C.Y.Poon, P.Chiu, *Tetrahedron letters*, 45, **2004**, 2985-2988.
- 11- C.Y. Poon, P.Chiu, *Tetrahedron letters*, 45, **2004**, 2985-2988.
- 12-B.Gregory , A. F.Parsons, C.B.Tomad, *Tetrahedron letters*, 41, **2000**, 7751-7755.
- 13-J.H.Ye, J.Xue, K.Q.Ling, J.H. Xu, *Tetrahedron letters*, 40, **1999**, 1365-1368.
- 14-J. Kulagowski, P.Baker, N.S.Curtis, and all, *J.Med.Chem*, 37, **1994**, 1402-1405.
- 15- R.J DeVita, D.D.Hollings, M.T.Goulet, *J.Med.Chem*, 9, **1999**, 2615-2620.
- 16-K. Ranjan, D. Neela, B. Fatema,R.A.Parikh, *Cemical Society*,78, **2001**, 47-48
- 17-H.Hayashi, M.I.Miki, et all, *J.Med.Chem*, 35, **1992**, 4893.
- 18-T.Fujio, E.Kazuyoshi, T.Yoshinori, *J.P.n, Kokai TokkyoKoho*, **1989**, p.46
- 19-K.Y. Lee, J. N. Kim, *Chem.Soc*, 7, 23, **2002**, 939-940.
- 20-B.M.Swahn, A.Caesson, B.Pelcman, Y.Besidki, H.Molin, M.P.Sandberg, *Bioorganicand Medicinal Chemistry Letters*, 14, **1996**, 1635-1640
- 21-J.Benoit , F.Darro, A.Béhard, *Medicinal Chemistry*,12, **2001**, 6759-6763.
- 22-O.Meth Cohn, *Tetrahedron letters*, 26, **1985**, 1901.
- 23-S.P.Rajendran, V.Arisvaran, M.Ramesh, *Chimical procedure*, **1981**, 160-162.
- 24-A.Rebstck, F.Mongin, F.Técourt, *Tetrahedron letters*, 43, **2002**, 767-769
- 25-R.Mlcent, F.Chau , *Chimie Organique Hétérocyclique*,Ed.EDP. Sience, **2003**, p 422.
- 26-F.Zetzsche, M.Nachmann, H.chim, *Acta*, 9, **1926**,979
- 27-O.A.El-Sayer, HY.Aboul-Enien, A.Phrm, *Med.Chem*, 334, **2001**, 117-120.
- 28-F.Guenfoud, « *Thèse de magistère* », Centre Universitaire d'Oum El Bouaghi, **2005**.
- 29-S.P.Rajendran, R.Karvembu,*Indian Journal of Chemistry*, 41,**2002**,222-224.

- 30-** T.Tilakraj,P.Amberkar, Y.Sarvottam, *Journal of Indian Chemical Society*,63,**1986**, 981-983.
- 31-** T.Tilakraj,P.Amberkar, Y.Sarvottam, *Journal of Indian Chemical Society*,62,**1985**, 251-253.
- 32-** Z.Jasinska, W.Kolosa, Anna. Inst.Chem, Jagiellonian Univ.Krakow, *Roczniki Chemii*, 50, **1976**, 625-645.
- 33-**M.Laabassi., R.Grée, *Tetrahydron Letters*, 29, **1988**, 611.

Conclusion Générale

Conclusion Générale

Ce travail qui entre dans le cadre d'un axe de recherche développé dans notre laboratoire, est consacré à la synthèse et l'évaluation de nouveaux dérivés quinoléiques du point de vue biologique et thérapeutique. Ceci concerne, la synthèse de nouveaux Alcools quinoléiques et de nouvelles Lactones quinoléiques benzyliques.

Dans la première partie de ce travail, nous avons montré l'importance des dérivés quinoléiques qui occupent une place appréciable, dans les domaines pharmaceutique et médical. Aussi, nous avons montré l'intérêt synthétique de la méthode de METH-COHN, pour la préparation des produits de départ.

Dans la seconde partie, nous avons développé une synthèse courte et efficace de 5 Alcools quinoléiques nouveaux non connus jusqu'à présent dans les travaux de la littérature.

Enfin, dans la troisième et dernière partie nous avons présenté un résumé bibliographique exhaustif sur l'intérêt biologique des quinolones et les plus récentes méthodes de synthèse des Lactones et leur application dans le domaine médical.

Ainsi, les résultats obtenus au laboratoire concernent la synthèse de 5 nouvelles lactones benzyliques quinoléiques. Les méthodes modernes d'Analyse ont joué un rôle très important dans la caractérisation et la confirmation des structures des différents produits recherchés et leurs intermédiaires.

Annexes

H1 - CDCl₃/TMS

+ un peu de méthanol

C13 - Déc. total H1
CDCl₃/TMS

+ un peu de méthanol

*** Current Data Parameters ***

NAME : f-111
EXPNO : 10
PROCNO : 1

*** Acquisition Parameters ***

BF1 : 100.6127290 MHz
BF2 : 400.1300000 MHz
DATEt : 00:42:11
DATEd : Sep 27 2004
DP07 : edit
LOCNUC : 2H
NS : 4096
NUCLEUS : 13C
PULPROG : zgpg30
RG : 32768.0000000
RO : 20 Hz
SOLVENT : CDCl₃
SW : 261.5265 ppm
SWH : 26315.789 Hz
TD : 65536
TE : 300.0 K

*** 1D NMR Plot Parameters ***

SR : 39.46 Hz
ppmcm : 14.06
Hzcm : 1414.69
YValcm : 42721.94
Rec : F1
MPSF : 1.0000000
AQtime : 1.2451840 sec

C13 - DEPT 135
CDCl3/TMS

+ un peu de méthanol

*** Current Data Parameters ***

NAME : f-111
EXPNO : 12
PROCNO : 1

*** Acquisition Parameters ***

BF1 : 100.6127290 MHz
BF2 : 400.1300000 MHz
D: Et : 02:05:22
D: Ed : Sep 27 2004
DFu7 : edit
LC:NUC : 2H
NS : 2048
NUCLEUS : 13C
PULPROG : dept135

RG : 32768.0000000
RO : 20 Hz
SOLVENT : CDCl3
SW : 248.4527 ppm
SWh : 25000.000 Hz
TD : 65536
TE : 300.0 K

*** 1D NMR Plot Parameters ***

SR : 39.30 Hz
ppmcm : 13.36
Hzcm : 1343.94
YVolcm : 2591.01
Rec : F1
MPSF : 1.0000000
AQtime : 1.3107200 sec

C13 - DEPT 135
DMSO-d6/TMS

forme ouverte quinolone acide
par hydrolyse par l'eau contenue
dans le DMSO.

H1 - DMSO-d6/TMS

forme ouverte quinolone acide
par hydrolyse par l'eau contenue
dans le DMSO.

*** Current Data Parameters ***

NAME : F-II3
 EXPNO : 11
 PROCNO : 1
 *** Acquisition Parameters ***
 BF1 : 400.1300000 MHz
 BF2 : 400.1300000 MHz
 DATET : 21:00:29
 DATEd : Sep 19 2005
 LOCNUC : 2H
 NS : 8
 NUCLEUS : 1H
 PULPROG : zg30
 RG : 2048.000000
 RO : 20 Hz
 SOLVENT : DMSO
 SW : 18.1099 ppm
 SWH : 7246.377 Hz
 TD : 32768
 TE : 300.0 K
 *** 1D NMR Plot Parameters ***
 SR : 1.07 Hz
 ppmcm : 0.97
 Hzcm : 389.16
 YValcm : 705.88
 Rec : F1
 MPSF : 1.000000
 AQtime : 2.2609920 sec

Résumé

Le but de ce travail est la synthèse de nouvelles molécules à noyau quinoléique susceptibles de présenter une activité biologique.

Le premier chapitre est consacré à l'intérêt biologique des quinoléines et leurs différentes méthodes de synthèse.

Dans le second chapitre, nous avons présenté l'intérêt biologique des quinoléines substituées en position 2 et 3. Ainsi, les résultats obtenus dans la synthèse des nouveaux alcools quinoléiques au nombre de 05, n'ont jamais été obtenus auparavant.

Le troisième chapitre décrit la synthèse régiosélective des lactones quinoléiques, selon une méthodologie simple et efficace à partir du même produit de départ utilisé lors de la synthèse précédente qui est le chloro-2-formyl-3-quinoléine (substitué).

Mots clés :

Quinolone – oléfines dérivés de l'acide de Meldrum – régiosélectivité – produits alkylés – quinoléiques lactones- quinoléiques alcools.

المخلص

الهدف من هذا العمل هو تحضير جزيئات جديدة لها نواة الكينوليين يحتمل أن تكون لها فعالية بيولوجية.

والفصل الأول من هذا العمل : تم فيه عرض النشاط البيولوجي لهذا النوع من المركبات وكذا طرق تحضير الكينوليينات.

وفي الفصل الثاني لقد قدمنا الفائدة البيولوجية للكينوليينات المستبدلة في الوضعية 2 و 3 كما قدمنا النتائج التي تحصلنا عليها في اصطناع الكحوليات الكينولينية والتي عددها 05، التي لم يتمكن الحصول عليها من قبل.

أما الفصل الثالث فقد قدمنا وصف للاصطناع الانتقائي الموضعي للاكتونات البنزيلية حسب طريقة سهلة وفعالة ابتداء من نفس المركب الابتدائي الذي استخدم في الاصطناع السابق و المتمثل في 2-كلورو-3-فورميل الكينوليين (مستبدل) .

مفاتيح اللفظ:

الكينولين - الكينولون- مشتقة من حمض ملدروم - انتقائية موضعية - اللاكتونات الكينولينية – الكينوليينات

الكحولية.